KGMP
적격업체

A16653111

이담소화제

벤도린정

(알리벤돌)

VENDORIN Tab.

전문의약품
분류번호:239

500정

【 원료약품의 분량 】 1정중
알리벤돌(식품의약품청고시 제98-127호) ····· 100mg
【 성　상 】 적색의 장방형 당의정
【 효능·효과 】
1.주 효능·효과
소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상치료
【 용법·용량 】
성인:알리벤돌로서 1일 300~400mg(3~4정)을 3~4회 분할하여 식전 및 취침시 경구투여 한다.
연령,증상에 따라 적절히 증감한다.
【 저장방법 】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【 사용상의 주의사항 】
1 일반적 주의
1)다른 약물을 투여받고 있는 경우에는 투여하기전에 약사 또는 의사와 상의한다.
2)2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 미만의 영·유아에게 경구 투여하지 않는다.
3. 저장상의 주의사항
1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2)직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3)오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

8 806104 803736

제조발매원
永一藥品工業株式會社
충북 진천군 진천읍 신정리 521-15

제조번호:

사용기한:

이담소화제

KGMP	전문의약품
적격업체	분류번호:239

벤도린정

(알리벤돌)

VENDORIN Tab.

현대인의 영양상태는 급격히 개선되었음에도 불구하고 정신적 · 육체적 피로, 불규칙적인 식생활 및 외부자극등은 위장의 부담을 가중시켜 소화불량, 속쓰림, 위통 등 여러가지 불쾌한 증상을 일으킵니다.
벤도린정은 이와같은 위장질환의 증상을 신속히 개선되는 이담소화제입니다.

【원료약품의 분량】 1정중

알리벤돌(식품의약품청고시 제98-127호) 100mg

【성　　상】 적색의 장방형 당의정

【효능 · 효과】

1. 주 효능 · 효과
   소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상치료

【용법 · 용량】

성인 : 알리벤돌로서 1일 300~400mg(3~4정)을 3~4회 분할하여 식전 및 취짐시 경구 투여 한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【특징 및 작용】

1. 소화촉진작용
   분비된 담즙은 지방분해효소인 Lipase의 작용을 쉽게하고, 소장의 연동운동을 활발하게 하며, 음식물의 배설을 촉진합니다.
2. 담즙생성 · 분비촉진작용
   대표적인 이담제인 Dehydrocholic acid와 비교시험에서, 벤도린정은 약효측면에서 비슷하였지만, 지속시간 측면에서 더 우수하였습니다.
3. 진경작용 · 변비개선작용
   벤도린정은 Papaverin과 유사한 진경작용을 나타내며, 동물시험결과 Morphine · HCl 또는 Barium Chloride의 투여로 유발된 장관의 긴장을 정상화시켜줍니다.

【사용상의 주의사항】

1. 일반적 주의
   1) 다른 약물을 투여받고 있는 경우에는 투여하기전에 약사 또는 의사와 상의한다.
   2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세 미만의 영 · 유아에게 경구 투여하지 않는다.
3. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는곳에 보관한다.
   2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

* 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 영일약품(주)학술개발부(TEL : 02-522-0150)로 문의 바랍니다.

YI-020614

제조발매원
永一藥品工業株式會社
서울특별시 서초구 방배동 920 – 27