

디아로펜^{캡슐}

디아로펜 캡슐은 장내 건강 유지에 필수적인 유산균, 장의 연동운동을 효과적으로 억제시켜 주는 염산로페라미드, 수렴방부작용이 있는 염화베르베린, 살균작용이 있는 아크리놀을 함유하여 세균 감염, 스트레스, 소화불량, 음식이나 물을 갈아 먹을 때, 유해물 중독 등 여러가지 원인에 의한 각종 배탈, 설사에 빠르고 우수한 정장·지사 작용을 나타냅니다.

성상	황색의 분말이 들어 있는 상부 연등색, 하부 담황색의 경질캡슐
성분·함량	1캡슐중 스트렙토코카스페칼리스 F-100균(식약청고시) 5mg (스트렙토코카스페칼리스균으로서 5×10^7개 염산로페라미드(약전) 0.25mg 염화베르베린(무수물로서)(약전) 20mg 아크리놀(약전) 20mg
약리작용	1. 연동운동 억제작용 디아로펜 캡슐은 장관벽의 근육층에 직접 작용하여 장의 연동운동을 효과적으로 억제시켜 주며, 분변중의 수분과 전해질을 제거하여 변을 경화시키고 분변의 부피를 감소시켜 줍니다. 2. 수렴, 방부, 살균작용 디아로펜 캡슐은 완화된 수렴, 방부작용에 의해 삼출성 염증을 소실시키며, 세균성 설사의 주원인균인 포도구균, 적리균, 살모넬라균, 장티푸스균 등에 강력한 살균작용을 나타내어 소화불량성 설사, 부패성·발효성 설사에까지 우수한 효과를 나타냅니다. 3. 장기능 강화작용 디아로펜 캡슐에는 유산균이 배합되어 장내 유해균에 대항하며, 장기능을 강화시켜 장내를 건강하게 유지시켜 줍니다.
효능·효과	설사, 복통을 수반하는 설사, 묽은 변, 식체, 토사
용법·용량	성인(15세이상)은 1회 2캡슐, 1일 2회 복용하십시오. 설사가 멈추면 복용하지 마십시오. 복용간격은 4시간 이상으로 하십시오.
사용상의 주의사항	1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 1) 지금까지 약에 의한 알러지증상, 예를 들면 발진, 발적, 가려움 등을 나타낸 적이 있는 사람

- 2) 발열을 수반한 설사가 있는 사람
- 3) 고령자
- 4) 혈변이 있는 사람, 점액변이 계속되는 사람
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 것으로 생각되는 부인
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 부작용

- 1) 이 약의 복용에 의해 알리지증상(예를 들면 발진, 가렵움등)이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 이 약의 복용에 의해 변비가 생기는 일이 있습니다. 특히 변비를 피하지 않으면 안되는 항문질환 등이 있는 사람은 주의해서 복용하십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 엄수하십시오.
- 2) 이 약은 소아에 복용시키지 마십시오.
- 3) 급성기의 격심한 설사의 경우 또는 구기, 복통, 복부팽만 등의 증상을 수반한 설사의 경우, 이 약으로 무리하게 설사를 멈추면 오히려 병세를 악화시키는 일이 있으므로, 이와 같은 경우에는 복용에 대해서 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 2일간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우는, 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포 장 단 위

10캡슐, 12캡슐

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0401-02



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr