신속한 알레르기 치료제

알레드®정

일반의약품

분류번호
1 4 1

최근 더욱 심각해진 환경오염, 직업성 알레르기, 정신적 스트레스 등으로 인해 알레르기 환자수가 점차 증가하고 있습니다. 알레르기를 일으키는 원인물질은 알레르겐이라 부르며, 대표적으로 집먼지, 진드기, 꽃가루, 곰팡이, 동물의 털, 음식물, 약물, 접촉성 항원 등이 있습니다. 이 밖에도 운동성 알레르기, 심지어는 스트레스가 알레르기의 원인이 될 수도 있습니다. 알레르기 반응은 대부분 알레르겐에 과민반응을 보이는 사람에서 나타나며, 흔히 알레르기성 비염, 천식, 결막염, 피부염의 형태로 나타납니다.

알레드®정은 선택적으로 H_1-히스타민 수용체만 차단하는 강력한 항알레르기 작용을 나타내어 각종 알레르기 질환을 효과적으로 개선시켜 줍니다. **알레드®**정은 졸리움 등의 중추 진정작용이 없이 신속하게 작용을 나타내며, 지속시간이 길어 1일 1회 복용하는 간편한 제제입니다.

성분 · 함량

1정 중
염산세티리진 (BP) 10mg

성상

백색의 원형 필름제피정

약리작용

1. **알레드®** 정은 초기 알레르기 발생기전에서 비만세포의 히스타민 유리를 억제하고 H_1-수용체를 효과적으로 차단하며, 후기에서는 염증반응에 관여하는 호중구가 염증부위로 이동하지 못하도록 막아 호중구의 활성화를 억제시켜 만성적으로 알레르기가 진행되는 것을 예방합니다. **알레드®** 정은 알레르기 반응의 전과정에 관여하여 강력한 항알레르기 작용을 나타내어 각종 알레르기 질환을 효과적으로 개선시켜줍니다.
2. **알레드®** 정은 혈액 뇌관문을 통과하지 않고 선택적으로 말초성 H_1- 수용체에만 작용하므로 중추억제작용에 의한 졸음 및 진정의 부작용이 없어 운전자, 기계조작자 등에도 투여할 수 있으며 세로토닌이나 콜린 수용체에 작용하지 않아 구갈, 배뇨곤란, 위장장애 등의 부작용을 나타내지 않습니다.
3. **알레드®** 정은 1일 1회 1정 복용으로 복용 후 70%이상이 위장관에서 빠르게 흡수되어 30분만에 효과가 나타나며 투여 후 1시간이면 최고 혈중농도에 도달합니다. 또한 간장내의 효소에 의해 거의 대사되지 않고 소변으로 배설됩니다. 또한 약효가 24시간 지속되어 급성기는 물론 장기간의 치료를 요하는 환자들에게도 적합한 빠르고 강력한 약물입니다.
4. **알레드®** 정은 타약물과 병용투여시에도 약물상호작용이 없습니다. 또한 **알레드®** 정은 음식물과 함께 복용해도 흡수에 전혀 지장이 없으므로 복용시간에 따른 불편함이 없습니다.

효능 · 효과

1. 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성 두드러기, 피부소양증
2. 하이드로코티손 외용제와 병용에 의한 습진, 피부염

용법 · 용량

성인 및 6세이상 소아 : 염산 세티리진으로서 1일 1회 10mg(1정)을 취침전에 경구투여합니다. 부작용에 민감한 환자의 경우는 5mg씩 아침, 저녁에 분할 투여합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
   2) 신부전 환자
   3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
   4) 6세 미만의 유아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 신장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
   2) 간장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
   3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
3. 부작용
   1) 정신신경계: 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중, 흥분이 나타날 수 있습니다.
   2) 소화기계: 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상이 나타날 수 있습니다.

3) 순환기계: 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있습니다.
4) 혈액: 맥관염, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 드물게 단구증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있습니다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 하십시오.
5) 과민증: 광과민증, 아나필락시 쇽, 때때로 부종, 드물게 발진, 가려움, 맥관부종이 나타날 수 있습니다.
6) 눈: 드물게 흐린 시력, 결막충혈이 나타날 수 있습니다.
7) 간: 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ-GTP, LDH의 상승 등 간기능장애 (초기증상: 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
8) 신장: 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있습니다.
9) 기타: 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의
건강한 지원자에게 1일 20~25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작시에는 용량을 초과하지 않도록 하십시오.

5. 상호작용
다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 마십시오.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물 실험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 마십시오.
2) 이 약은 모유를 통해 미량 분비되므로 투여중에는 수유를 중단하십시오.

7. 소아에 대한 투여
1) 6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 마십시오.

8. 고령자에 대한 투여
이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중농도 과다 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 하십시오.

9. 과량투여시의 처치
과량 투여시의 증상은 진정입니다. 이 경우 위세척을 실시하십시오.

10. 임상검사치에의 영향
이 약은 알레르기항원피내반응을 억제하므로 알레르기항원피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

11. 기타
증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있습니다.

저 장 방 법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포 장 단 위 10, 30, 100, 200, 300, 500, 1,000정

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

P0211-02

일양약품주식회사
경기도 용인시 기흥읍 하갈리 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 :031-270-6158 홈페이지 www.ilyang.co.kr