



일반의약품 분류번호: 312

일상생활 중에서 흔히 경험할 수 있는 신경통 · 요통 등은 다음 세가지의 장애로 인해 일어난다고 할 수 있습니다.

1. 근육 중에 피로물질(젖산 등)이 축적되어 근육이 굳게되어 염증이 발생한다.
2. 근육 중 혈관에서의 혈행장애로 인한 산소와 영양소의 공급부족으로 피로 물질이 축적되어 근육의 경직이 발생한다.
3. 통증과 저림을 전해주는 말초신경이 압박되거나 손상되어 통증, 저림, 결림의 증상이 나타난다.

맥티정은 활성형비타민 B₁₂인 메코발라민을 주성분으로하여, 손상된 말초신경을 재생시킴으로 신경통 · 요통 등의 증상을 완화시켜줍니다. 또한, 혈행을 개선시키는 비타민 E, 근육 활동을 촉진시켜 주는 활성형비타민 B₁과 비타민 B₆를 복합 처방한 제제입니다.

성상 : 진한 갈색 원형의 필름코팅정

원료약품 및 그 분량

메코발라민(JP)	500 μ g
초산토코페롤 50%(식물의약품안전청고시)	66.6mg
(초산토코페롤로서 33.3mg)	
염산푸르셀티아민(약전)	9.1mg
염산피리독신(약전)	16.66mg

효능 및 효과

다음 증상의 완화 : 요통, 수족저림, 신경통, 어깨 · 목 결림

용법 및 용량

15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정을 1일 3회 식후 복용한다.

포장 단위

90정, 180정

저장 방법

차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
 - 2) 15세 미만의 어린이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. - 레보도파
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 · 수유부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 발진, 발적, 가려움
 - 2) 식욕부진, 구역, 구토, 구내염, 복부팽만감, 위부불쾌감
 - 3) 묽은 변, 변비, 설사와 같은 증상이 지속되거나 심해질 경우
 - 4) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 5) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 현자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 6) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 7) 열상이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있다.
5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여할 것.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하여 복용할 것.
 - 4) 수은 및 수은화합물을 취급하는 직업종사자에 장기간 대량 투여하는 것은 피하는 것이 바람직하다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
 - 4) 내용물의 포장을 개봉한 후 6개월 이내에 사용할 것.

- * 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
- * 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시기 바랍니다.

문안작성일 : 2007. 11. (Rev. 3)

↓ 뒷면계속

