일반의약품	분류번호:114

양약+한약+비타민으로 만든 종합 감기약

ISO9001인증업체	KGMP적격업체

콜콜®-에스 캡슐

Colcol®-S Caps.

감기는 바이러스에 의한 상기도(비강, 인두, 후두, 기관지) 감염증으로 발열, 두통, 콧물, 코막힘, 기침, 가래 등의 증상이 복합적으로 나타나는 질환입니다.
콜콜 - S 캡슐은 양약, 한약, 비타민이 복합 처방된 종합감기약으로 콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통 등을 완화하는 성분이 이상적으로 배합되어 복합감기의 제증상에 신속하게 작용합니다. 또한, 비타민 B_1, B_2, C가 함유되어 발열에 의한 비타민 손실을 보충하여 주므로 저하된 신체의 기력을 회복시키고, 초기 감기의 증상을 개선합니다.

성 상

황색-미황색의 분말이 든 상부, 하부 연하늘색의 경질캡슐제

원료약품 및 그 분량

1캡슐 중

아세트아미노펜(약전)	200mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
염산슈도에페드린(USP)	15.00mg
브롬화수소산덱스트로메토르판(약전)	7.50mg
구아이페네신(약전)	21.00mg
무수카페인(약전)	20.00mg
감초엑스분말(14.3→1)(별규)	25.00mg
인삼건조엑스(14.5→1)(별규)	10.00mg
질산치아민(약전)	4.00mg
리보플라빈(약전)	2.00mg
제피아스코르빈산(식약청고시)	15.625mg
(아스코르빈산으로서 15.0mg)	

효능 및 효과

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

약리작용 및 특징

1. 해열진통제인 아세트아미노펜을 함유하여 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통 등에 효과를 나타내며 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민으로 콧물, 코막힘, 재채기 등에 신속한 효과를 나타냅니다.
2. 한약성분으로 감초엑스와 인삼엑스를 함유하여 인후통, 기침을 완화시키며 저하된 신체 기력회복에 좋습니다.
3. 발열에 의한 에너지나 비타민의 손실을 보충하기 위해 비타민 B_1, B_2를 함유함으로서 감기로 인한 체력소모를 보강하며, 면역증강 작용이 있는 비타민 C를 처방하여 감기로부터 빠른 회복을 도와줍니다.

용법 및 용량

7~10세 : 1회 1캡슐, 1일 3회,
15세 이상 : 1회 2캡슐, 1일 3회,
식후 30분 복용

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

10캡슐

사용상의 주의사항

1. 경고 - 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.
2. 다음 사람은 복용하지 말 것.
   1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
   2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.

⬇ 뒷면계속

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

· 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
· 인터넷홈페이지 http//www.choa.co.kr
· 공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
· 수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
   1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
   2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
   3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
   4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.
   5) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
   6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
   7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
   8) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
   9) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자　　10) 부종이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
   1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
   2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
   3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
5. 부작용
   1) 정신신경계 : 출혈성뇌졸증, 어지러움, 불면, 심한 두통, 신경과민을 일으킬 수 있다.
   2) 순환기계 : 심계항진을 일으킬 수 있다.
   3) 소화기계 : 구역, 구토, 변비, 식욕부진이 나타날 수 있다.
   4) 기타 : 발진, 발적, 배뇨장애가 나타날 수 있다.
6. 복용중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.
   1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
   2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
   3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
   4) 장기 연용하지 말 것.
   5) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드제 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
7. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.
   1) 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
   2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것. - 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
   3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것.
   4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
   5) 복용시 주의사항
   · 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
     ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가와지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
     ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
     ③ 천식이 나타난 경우
   · 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간 독성을 증가시킬 수 있다.
8. 보관 및 취급상의 주의
   1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
   3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
※ 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.

문안작성일 : 2004. 7. (Rev. 1)