

KGMP적격업체



설사, 묽은 변
식체, 토사
복통을 수반하는 설사

배탈, 설사에 효과 빠른 복합지사제

탈스탑 캡슐

TALSTOP Caps.

복합지사제 / 12캡슐



【성상】 엷은 황갈색의 분말이 든 미황색의 경질 캡슐제

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

탄산수베르베인(약전)..... 50mg

(베르베인으로서 14.8mg)

차질산비스마스(약전)..... 100mg

(비스마스로서 73mg)

우르소데옥시콜린산(약전)..... 2mg

스코폴리아엑스 10배산(약전)..... 50mg

(총 알칼로이드(히오스시아민 및 스코폴라민)으로서 45 μ g)

【효능·효과】

설사, 복통을 수반하는 설사, 식체, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

성인, 2캡슐, 11~14세; 1~2캡슐, 8~10세; 1캡슐 씹 1일 3회 복용

【자장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부, 신생아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 약으로 알레르기증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2) 발열을 수반하는 설사환자, 고령자, 혈변환자 또는 점액변이 계속되는 환자

3) 위·십이지장궤양 등이 있는 환자

4) 소아 5) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.

2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여할 것.

3) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통, 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로無理하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 약사 또는 의사와 상의할 것.

4) 투여시에는 중독하지 말 것.

5) 수회간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것

6) 3일 이상 계속하여 투여하지 말 것.

5. 상호작용

위장진통·진경제와 병용투여하지 말 것.

6. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 말 것.

7. 자장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것.

3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시기 바랍니다.

※ 수신자부담소비용지상담실 : 080-988-8888

TALSTOP Caps.

 **조아제약(주)**
CHO-A PHARM. CO., LTD.

일반의약품 분류번호: 237

본사: 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
공장: 경남 함안군 함안면 파수리 465
인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>