알피트정

분류번호:124

전문의약품

【원료약품 및 그 분량】
1정 중
브롬화시메트로피움(별규) ····· 50mg

【성 상】
백색의 원형정제

【효능·효과】
위장관계·담도계·비뇨기계의 경련 및 기능적 운동장애, 간산통, 신산통, 월경곤란

【용법·용량】
성인 : 브롬화시메트로피움으로서 1회 50mg 1일 3회 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1)전립선 비대환자
   2)요폐 환자
   3)장폐색, 유문협착 환자
   4)녹내장 환자
   5)근무력증 환자
   6)이약에 과민증 환자
   7)거대결장 환자
   8)회장마비 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1)자율신경계 질환 환자
   2)간·신질환 환자
   3)갑상선기능항진증 환자
   4)관상동맥질환 환자
   5)울혈성 심부전 환자
   6)부정맥 환자
   7)고혈압 환자
   8)이상고열증 소아
3. 부작용
   1)고용량 사용할 때 시조절장애, 빈맥을 동반한 심계항진, 감각 장애가 나타날 수 있다.
   2)배뇨곤란, 안내압 증가, 두통, 어지러움, 다행증, 졸음, 무력, 변비, 구역, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   이 약에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 이 약 투여중 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
   페노치아진계 약물, 항우울약, 항히스타민제, 기타 다른 항콜린성 약물과 병용하지 않는다.
6. 임부에 대한 투여
   임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
7. 과량투여시의 처치
   과량투여에 의한 급성 중독일 경우에는 살리실산피소스티그민 1~2mg을 근육주사하고 증후에 따라 적절한 처치를 한다.

【저장방법】
밀폐용기, 실온보관 (1-30℃)

【포장단위】
자사포장단위

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)

작성년월 : 02. 4.
개정년월 : 02. 5.〈H02〉

제조·판매원
하나제약주식회사
경기도 화성시 향남면 상신리 907-3