



어린이 보호용 안전포장

기침, 가래에

메가코프정

효과빠른 기침약



중근당

제약회사
Kyongbo Pharm

10정

일반의약품

■ 원료약품 및 분량 : 1정중

브로마수소산덱스트로메토르판(K.P)	7.5mg
구아이페네신(K.P)	40mg
염화리소짐(K.P.C)	10mg
아세트아미노펜(K.P)	200mg

■ 사용상의 주의사항

- 경고
 - 매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈, 혀, 입술 등을 일으킨 적이 있는 사람)
 - 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 다음의 사람은 복용전에 약사와 상의할 것.
 - 본인, 양친 또는 형제들이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의한 알레르기 증상에(발열, 발진, 관절통, 현식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 14세 이하의 어린이
- 간경, 신장, 감작성질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
- 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 뇌내장(예:눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 부작용

피부 : 스티븐스-존슨증후군(피부점막만종후군), 리델증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상상의수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일

■ 성상 : 연청색의 장방형 필름코팅정

■ 효능·효과

감기의 제증상(인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

의약품분류번호:114

어키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

5. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 용법·용량을 잘 지킬 것
- 다음의 약들과는 동시에 복용하지 않 것
진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
- 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것.
- 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부적당한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
- 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
- 장기연용하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

※ 본 제품은 우수약품 제조관리 및 품질 관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조 관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다.

MEGT 2007-08

판매원



제약회사
(주)경보제약
충남 아산시 신푼동 345-8

제조원

(주)한국퍼비스바이오텍
경기도 안산시 단원구 낙내동 456-3



■ 용법·용량

성인 : 1회 2정, 1일 3회
소아(8~14세) : 1회 1정, 1일 3회

■ 저장방법 : 기밀용기 실온(1~30℃)보관



분리배출



8 806110 101765