



PPA 성분이 없는 감기약

콧물/코막힘/재채기

안티노정

효과빠른 콧물감기약

일반의약품 10정

■ 원료약품 및 분량 : 1정중

아세트아미노펜(K,P)	500mg
염산슈도에페드린(U,S,P)	30mg
말레인산클로르페니라민(K,P)	2mg

■ 사용상의 주의사항

- 경 고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
3) 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키는 위문 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
5) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 백내관이나 있는 사람
6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 복용할 때 다음 사항을 주의한다.
1) 용법, 용량을 잘 지킨다
2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항호스타진제, 진정제 등
3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킨다
4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에 개는 부적당한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다
5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로

의약품분류번호: 114

■ 성 상 : 연한 옥색의 장방형 필름코팅정.

■ 효능 · 효과

감기의 재증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다

- 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
- 고열을 수반하며, 발진, 발적, 화상모양, 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
- 천식이 나타난 경우
- 바르비탈계 약물, 심한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
- 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의한다.
1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
2) 복용하는 동안 출혈이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전을 피한다.
3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
4) 장기 연용하지 않는다.
5) 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 곳에 보관한다.
3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
※ 본 제품은 우수약품 제조관리 및 품질 관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다. ANNT 2007-12

(주)한국파비스바이오텍

경기도 안산시 단원구 목내동 456-3
소비자상담실 031) 491-7178



본리배출

■ 용법 · 용량

성인 및 12세 이상의 어린이 : 매 6시간마다 2정 복용, 최대 하루 8정을 초과할 수 없다.

■ 저장방법

기밀봉기, 실온(1-30℃)보관



8 806110 101536