

위장기능 이상치료제

개 스티 캡슐

Gastin Cap.

개스티 캡슐은 소화기계 기능을 정상화시켜주는 clebopride와 simethicone의 복합처방으로 각종 기능성 소화장애로 약화된 위장기능을 정상화 시키면서 위·장내 가스를 제거해 줍니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐중

말산클레보프리트(이.피)	680 μ g
(클레보프리트로서 500 μ g)	
시메치콘(유.에스.피)	200mg

【성상】 백색의 가루 혹은 과립상이 든 상부 주홍, 하부 미황색의 경질캡슐

【약리작용 및 특징점】

1. 말초적 작용으로 위장관 기능저하를 초래하는 위장관 평활근의 도파민 수용체를 차단해 약화된 위장기능을 정상화시키고, 위 내용물 배출을 촉진시켜 복부팽만감, 상복부 압박감 등을 해소시켜 줍니다.
2. 중추신경계중 대뇌연변계의 도파민 수용체를 차단해 스트레스 및 불안감을 해소시켜 각종 신경성 위장질환에 좋은 효과를 발휘합니다.
3. 연수의 화학수용체중 도파민 수용체를 차단, 구토중추의 자극을 억제해 구역이나 구토증을 제거해 줍니다.
4. Cyclic-Amp의 활성억제, 위점막에서 가스트린의 분비를 감소시켜 위·십이지장 궤양을 치료합니다.
5. 시메치콘은 소화장애로 발생하는 위·장내 가스제거를 통해 복부팽만감, 상복부통증, 복부불쾌감, 트림 등 소화불량증상을 제거해 줍니다.

【효능·효과】

- 1) 공기연하증 및 고창에 수반하는 다음의 소화기능이상:
고창성 소화불량, 신경성 위장장애, 과민성 대장증후군
- 2) 엑스선 촬영시 장내 가스제거
- 3) 수술 후 고창에 수반하는 소화기능이상

【용법·용량】

성인 1회 1캡슐 1일 3회 식전에 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【저장 방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 3년

【포장단위】

자사포장단위

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 021021
설명서 개정일 080101

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 위장출혈, 폐색, 천공환자
 - 2) 신경이완제를 투여받고 있는 만발성 운동장애 환자
2. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.
고령자
3. 부작용
 - 1) 정신신경계 : 때때로 졸음, 초조감, 불면, 동요감, 입술·혀의 마비, 수족마비 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 주체외로계 : 드물게 구강의 경직, 유연 및 경부의 근경직 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 변비, 구역 또한 드물게 구갈, 식욕부진, 공복감, 설사 등이 나타나는 경우가 있다.
 - 4) 피부 : 드물게 피진, 가려움증, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.
 - 5) 내분비계 : 드물게 유즙누출, 파프로락틴혈증, 유선긴장, 무월경, 월경이상, 여성형 유방, 발기부전이 나타날 수 있다.
 - 6) 간장 : 때때로 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
 - 7) 혈액 : 메트헤모글로빈혈증이 나타날 수 있다.
 - 8) 기타 : 때때로 탈력감, 권태감, 드물게 수명감이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반한 기계조작에는 종사하지 않도록 주의한다.
 - 2) 진토작용에 의하여 장폐색, 뇌부종 등에 의한 구토증상을 은폐할 우려가 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여한다.
5. 상호작용
 - 1) 페노치아짓게 및 항도파민계 약물의 중추신경계에 대한 작용을 증강시킬 수 있다.
 - 2) 디곡신 및 시메티딘의 효과를 감소시킬 수 있다.
 - 3) 항콜린성 약물과 마약성 진통제는 소화관내에서 이 약의 효과를 감소시킬 수 있다.
 - 4) 알코올, 신경안정제, 수면제 또는 마약류와 병용투여시 진정작용이 나타날 수 있다.
6. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.
7. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 때에만 투여한다.
8. 수유부에 대한 투여
동물실험에서 유즙으로의 이행이 보고되어 있으므로 투여중에는 수유를 피하는 것이 바람직하다.
9. 과량투여시의 처치
과량투여시 졸음, 방향감각 상실, 추체외로증상 등이 나타날 수 있으며 위세척 및 대증요법을 실시한다. 추체외로 증상 치료에는 항파킨슨제, 항콜린제, 항히스타민제 등을 투여할 수 있다.