일반의약품	
분류번호	329

필수아미노산과 비타민의 복합처방

아미노탑 캅셀

AMINOTOP Cap.

아미노산은 단백질의 구성성분이고 인체내 에너지원으로도 쓰이며 비타민은 생명을 유지하는 각종 대사과정을 조절하는 필수요소중의 하나입니다. 필수아미노산과 비타민은 인체에서 만들어지지 않으므로 반드시 외부에서 섭취해야 하고 부족하면 여러 질환 및 스트레스에 대한 저항력이 약화되어 쉽게 피로를 느끼며 각종 질병에 걸리기 쉽습니다. 특히, 병중·병후, 회복기의 환자는 대사가 급속히 진행되어 영양이 불량해지고 비타민 및 아미노산의 영양불량은 질병에 대한 저항력을 감소시키게 됩니다.
아미노탑 캅셀은 필수아미노산과 각종 비타민을 이상적으로 배합하여 인체의 이러한 영양불량을 신속히 개선할수 있는 영양보급제입니다.

【원료약품의 분량】 1캅셀 중,

DL-메치오닌(약전)…… 9.2mg
L-로이신(약전)…… 9.15mg
L-발린(약전)…… 5.0mg
L-이소로이신(약전)…… 5.0mg
L-트레오닌(약전)…… 5.0mg
L-트리프토판(약전)…… 5.0mg
L-페닐알라닌(약전)…… 5.0mg
염산리신(약 전)…… 25.0mg
팔미틴산레티놀(USP)…… 1,000IU
에르고칼시페롤(약전)…… 100IU
50%초산토코페롤(식약청고시)…… 10mg
(초산토코페롤로서 5밀리그람)
질산치아민(약전)…… 2.5mg
리보플라빈(약전)…… 1.5mg
니코틴산아미드(약전)…… 10.0mg
염산피리독신(약전)…… 5.0mg
판토텐산칼슘(약전)…… 2.5mg
0.1%시아노코발라민(식약청고시)…… 0.5mg
(시아노코발라민으로서 0.5㎍)
엽 산(약전)…… 0.1mg
아스코르빈산(약전)…… 25.0mg

【특 장 점】

1. 아미노탑캅셀은 8종의 필수아미노산과 11종의 비타민이 함유된 약물로서 인체에 부족하기 쉬운 단백질과 필수영양소 공급이 가능합니다.
2. 아미노탑캅셀은 고단위 경구용 필수영양소 보급제로서 아미노산과 비타민의 이상적인 배합으로 필수영양소의 이용을 증가시켜 줍니다.

【성 상】

미황색의 분말이 들어있는 상, 하 갈색의 경질캅셀

【효능·효과】

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중·병후, 발열성 소모성질환, 임신수유기 등의 영양공급

【용법·용량】

성인 1일 2캅셀, 1일 1~2회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경 고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일이상 투여하지 마십시오.
(비타민A결핍증 환자는 제외)

2. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의합니다.

1) 1세 미만의 유아
2) 의사의 치료를 받고 있는 사람
3) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

3. 임부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학 조사 결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신을 희망하는 부인에 투여할 경우는 용법·용량에 주의하고 이약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울이십시오.

4. 복용시 다음 사항에 주의하십시오.

1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
3) 본 제제에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민A로서 1일 8,000단위 이상을 넘지 않도록 합니다.

5. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의하십시오.

1) 이 약의 복용에 의해 구역, 구토, 설사, 가려움증의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사또는 약사와 상담하십시오.
2) 이 약의 복용에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
3) 이 약의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있습니다. 출혈이 오래계속될 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.
4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.

6. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법·사용기한】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【포장단위】 90캅셀, 180캅셀

※본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

제조·판매원
한올제약주식회사
서울특별시 광진구 자양1동 766-15
공장: 대전광역시 대덕구 상서동400-1