

포린 정

K G M P	일반의약품
적격업체	분류번호: 141

PORIN Tab.

포린정은 뛰어난 비충혈 개선제인 염산페닐에프린과 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민이 효과적으로 배합되어 있어 콧물, 코막힘, 비충혈 개선에 뛰어난 작용을 합니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

말레인산클로르페니라민(약전) 4.0mg
염산페닐레프린(약전) 10.0mg

【성상】 연분홍색의 장방형 정제

【약리작용 및 특징점】

- 비충혈 제거작용 : 비충혈 제거제인 염산페닐에프린이 함유되어 있어서 비강내 울혈된 혈관을 수축하여 비충혈, 코막힘, 부종을 치료해 줍니다.
- 항히스타민 효과 : 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민이 함유되어 있어 감기, 비염, 상기도염에 수반되는 콧물, 코막힘, 재채기, 기침 등의 알러지 증상 치료에 효과를 나타냅니다.

【효능·효과】

- 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물.
- 부비동염에 의한 비충혈 일시적 경감.

【용법·용량】

- 성인(만 12세 이상) : 4시간마다 1정씩 복용하되, 24시간동안 6정을 초과하지 않거나 의사의 지시에 따른다.
- 만 6-12세 소아 : 4시간마다 1/2정씩 복용하되, 24시간동안 3정을 초과하지 않거나 의사의 지시에 따른다.
- 만 6세이하 소아 : 의사의 지시에 따른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자.
 - 특이 체질 환자
 - 수유부
 - 중증의 고혈압환자, 중증의 관상동맥질환 환자, MAO저해제 치료를 받고 있는 환자.
 - 협우각성 녹내장, 뇨저류, 소화성궤양, 천식, 폐기종, 만성 폐질환, 숨이 차거나 호흡곤란이 있는 환자
 - 진정제, 신경안정제를 투여 받고 있는 환자
- 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.
 - 만성 기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 갑상선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선 비대로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 말 것.
- 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.
- 부작용
 - 교감신경 아민을 포함한 약제는 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있다.
 - : 공포, 불안, 긴장, 쇠약, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관 허탈.
 - 페닐에프린에 과민인 사람은 빈맥, 동계, 두통, 어지러움, 오심 등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있다. 그러나 페닐에프린 적량 투여시에는 이런 부작용이 나타나지 않는 안전한 약물이다.
 - 항히스타민제에 과민인 사람은 중증도의 진정작용을 나타낼 수 있다.
 - 항히스타민제로 인한 다른 부작용은 구갈, 어지러움, 쇠약, 식욕부진, 오심, 구토, 두통, 신경과민, 다뇨증, 가슴앓이, 복시, 배뇨곤란 등이 있고 드물게 피부염이 나타날 수 있다.
 - 졸음을 일으킬 수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등이 졸음을 증가시킬 수 있다.
 - 어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의.
 - 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 의사와 상의할 것.
 - 이 약의 복용중에는 알코올성 음료를 피한다.
 - 이 약의 복용중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 한다.
 - 용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량 복용시에는 의사와 상의할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의할 것.
- 보관 및 취급상의 주의.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

【포장단위】 300정

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

- * 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 작성일자(2006년 8월)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 신정리 521-15

설명서개정년월 : 2006년 8월



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr