



정우 보중익기탕 EX정

정우보중익기탕엑스정은 응용범위가 넓은 名方인 고유의 보중익기탕을 정우제약의 독특한 제조공법과 엄격한 품질관리로 복원이 편리한 정제 형태로 개발한 제품으로서 손발을 움직이기가 싫거나, 말소리가 작거나, 눈에 힘이 없으며, 입안에 거품이 생기는 경우와 음식 맛이 없으며, 따뜻한 음식이나 물을 찾는 경우, 또한 동계(動悸 : 심장의 고동이 심하여 가슴이 울렁거리는 현상)가 있는 등 제반 증상에 주로 사용하는 제제입니다. 정우보중익기탕엑스정은 원기가 없고 허약하여 쉽게 피로감을 느끼거나, 면역기능의 저하로 만성적인 도한(盜汗 : 잘때 흘리는 식은땀)이 나며, 염증이 잘 감염되고, 한번 감염되면 잘 낫지 않는 질환과 담즙 분비 부족으로 인한 식욕부진 및 소화불량 등에 효과가 우수한 제제입니다.

약리작용

1. 백상, 황기, 백출, 감초는 인체의 에너지 대사를 원활히 하여 기력을 증강합니다.
2. 백상, 진피는 소화관 운동능력을 강화하고 시호는 담즙분비를 촉진하여 소화촉진 작용을 합니다.
3. 백상, 황기는 세포에 영양을 공급하여 도한(盜汗)을 완화하고, 당귀, 백출은 혈관을 확장하여 지한(止汗) 작용을 합니다.
4. 백상, 황기, 시호는 면역능력을 증강하여 만성항원항체반응에 의한 도한(盜汗) 증상을 개선합니다.

■원료약품의 분량 <1정(350mg)중>

백 상(약전)266mg (전세노사이드Rb ₁ 으로서 0.53mg)	감 초(약전)100mg (글리시리진산으로서 2.5mg)
백 출(약전)266mg	견 강(약전)34mg
황 기(약전)266mg	승 마(약전)66mg
당 귀(약전)200mg	이상 수침건조엑스 200mg
진 피(약전)134mg	
대 추(약전)134mg	
시 호(약전)134mg	

■성 상 : 갈색의 삼각형 정제

■효능 · 효과 : 원기가 없고 위장의 움직임이 쇠하여 피로하기 쉬운 사람의 다음의 제증 : 허약체질, 피로권태, 병후쇠약, 식욕부진, 식은땀

■용법 · 용량 : 보통 성인 1일 3회, 1회 5정씩 식전 또는 식간에 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
 - 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
 - 3) 부종이 있는 환자
 - 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본제의 복용에 의해 노랑이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
 - 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소해서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
 - 4) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증 : 발진, 두드러기 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우는 투여를 중지한다.
 - 6) 소화기 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 갑소함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드제 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
- 일반적 주의
 - 1) 이 약의 사용에 있어 환자의 증(證)(체질, 증상)을 고려하여 투여한다. 또한 경과를 충분히 관찰하고 복용 후 증상의 개선이 인정되지 않는 경우에는 계속 투여를 피하고 의사나 약사에게 상담한다.
 - 2) 이 약에는 감초가 포함되어 있으므로 혈청칼륨치 및 혈압 등에 충분히 유의하고 이상이 발견된 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 다른 한방제제 등과 병용투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다.
- 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
- 기타

습진, 피부염 등이 악화될 수 있다.

(의약품안전과-11924호, 2004.06.25)

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병·의원 등의 개설자를 통하여 교환하여 드립니다.

2006. 10. 작성



주식회사 정우제약

충남 아산시 신창면 읍내리 80-13

<http://www.pharm.co.kr>