

기침·가래에 기가·에이 연질캡슐

기침, 가래로 인해 일상생활에 지장을 초래하는 일이 많지만 이런 증상을 가볍게 생각하고 지나치는 사람들이 많습니다. 그러나 기침, 가래가 심하고 오래 지속되면 학업이나 업무에 미치는 영향이 매우 클 뿐만 아니라 체력이 소모되고 기관지등 호흡기의 손상을 일으킬 수도 있습니다.

기가에이 연질캡슐은 기침과 가래에 효과가 우수한 성분들을 이상적으로 배합하여 기침감기 뿐만 아니라 오래된 기침, 잘 가라앉지 않는 기침, 가래에도 신속한 효과를 발휘합니다.

■ 성분·함량 : 1캡슐 중

브롬화수소산덱스트로메토르판(약전)	15mg
염산노스카핀(약전)	20mg
염산트리메토퀴놀(약전)	2mg
구아이페네신(약전)	75mg
d-말레인산클로르페니라민(약전)	2mg

■ 성 상 : 무색내지 주황색의 점조성액이 들어있는 주황색의 투명한 타원형 연질캡슐제

■ 용법·용량 : 성인 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후에 복용합니다.

■ 효능·효과 : 기침, 가래

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
 - 약으로 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 간장애, 신장애, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자
 - 심장에 및 고혈압 환자, 고령자
 - 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 이상반응
 - 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 이 약을 투여하는 동안 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 상호작용 : 다른 약들과 병용투여하지 마십시오.
: 다른 진해 거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용 투여하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 본 제품은 재정경제부고시에 의거 소비자 피해를 보상해 드립니다.

〈이 첨부문서 작성일자(2001.10.22)이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.〉



마음까지 건강하게
(주)서울제약
경기도 시흥시 정왕동 1248-8번지
문의전화 : (080)780-1931