

인후통/오한/발열/두통

한신 노콜

캡슐

일반 의약품

분류번호 : 114

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그분량】 1캡슐(500mg)중

갈근탕엑스분말[6→1](별규)	250.0mg
아세트아미노펜(약전)	100.0mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
브롬화수소산덱스트로메토르판(약전)	7.5mg
구아야콜설포산칼륨(약전)	30.0mg
무수카페인(약전)	15.0mg

【성 상】 갈색의 분말이 충전된 상부 적갈색, 하부 담황색의 캡슐제.

【효능/효과】 감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화.

【용법/용량】 성인은 1회 2캡슐, 어린이(7~14세)는 1회 1캡슐씩, 1일 3회 식후 30분에 복용.

【사용상의 주의사항】

1. 경고.

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기 성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장 또는 신장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 6) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 9) 부종이 있는 사람

3. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것. 진해거

담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임 하에 복용시킬 것 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것. 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기 연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것. 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것. 2) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것 4) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것 5) 장기연용하지 말 것

6. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것(사용후 반드시 밀폐 보관할 것). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

【저장방법/사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월.

【포장단위】 10캡슐, 10캡슐×20EA.

*본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



주식
회사

한 국 신 약

본사/공장 : 충남 논산시 양촌면 중산리 805-15 TEL : (041)740-2345
<http://www.hsp.co.kr>

08302006