

어린이 보호용
안/전/포/장 도입!

대한민국 최초의 목전용 감기약

「일반의약품」

하벤[®] 목

캡슐

생약성분(황련/길경) 고단위 처방

감기는 바이러스에 의한 호흡기 감염증으로 코점막과 인두부분에 주로 염증이 발생하게 되는데 계절이나 기후가 변할 때 흔히 잘 걸리게 됩니다. 목감기는 매연, 담배연기 등으로 공기가 탁한 환경에 노출되어 있는 현대인에게 자주 빈발하는 질환으로, 목안이 붓고 아프며, 목소리가 쉬게 되고 보통 열, 기침, 가래 등을 동시에 수반하게 됩니다.

하벤목캡슐은 목감기의 주증상인 발열, 인후통, 목의 염증 및 기침 등에 뛰어난 효과를 나타내는 5가지 양약 성분과 2가지 생약성분을 함유한 목감기전용 감기약입니다. 특히 소염진통작용이 뛰어난 에텐자미드와 기침 및 기관지염증에 좋은 효과를 가진 길경, 황련 두가지 생약이 기존 감기약에 비해 고단위로 처방되어 있어 잘 낫지 않는 목감기 증상에 뛰어난 효과를 나타냅니다.

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1캡슐 중

아세트아미노펜(약전)	120mg
에텐자미드(약전)	100mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
브롬화수소산덱스트로메토르판(약전)	7.5mg
염화리소짐(KPC)	10mg(역가)
황련엑스산(KPC)	21mg
길경50%에탄올건조엑스(10→1)(별규)	20mg

■ 성상 : 미황갈색의 분말 또는 과립이 들어있는 상 · 하부 흰색의 경질캡슐제

■ 효능 · 효과 :

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

■ 용법 · 용량 : 성인 : 1회 2캡슐, 어린이(8-14세) : 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.

3. 이상반응

- 1) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진 · 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의합니다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받습니다.
- 2) 유아에서 이 약에 함유된 염화리소짐을 처음으로 복용했을 때, 속(아나필락시)이 나타났다는 보고가 있으므로 복용전에 의사 또는 약사와 상의합니다.

4. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

5. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.

- 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임 하에 복용시키십시오.
 - 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
 6. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
 - 3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 4) 장기연용하지 마십시오.
 - 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해 해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
 - 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
 7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온보관(1~30℃) (사용기간 : 제조일로부터 36 개월)


■ **포장단위** : 10캡슐

■ **첨부분서 작성일** : 2006년 10월 30일

■ **소비자 상담실** : (02)529-6100~9 (교환)312

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

6-10-30



- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부분서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 회사로 문의하십시오.
- ※ 회사 홈페이지 주소 : <http://www.nicepharma.com>
- ※ 첨부분서 작성일 이후에 변경된 허가사항은 소비자 상담실 또는 회사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사

본사 : 서울특별시 강남구 도곡동 423-2 ☎ (02)529-6100~9
 공장 : 경기도 이천시 신둔면 수광리 486 ☎ (031)634-7100~2