

조혈비타민 3종 보강 빈혈치료제

산타몬플러스 캡슐

글루콘산제이철나트륨복염 + 엽산 / 시아노코발라민 / 엽산피리독신

빈혈은 가장 흔한 질환 중의 하나로서 성인여성의 45%, 10대 여성의 약 60%가 철결핍성빈혈이라고 합니다. 임신부는 조혈제를 복용하지 않을 경우 빈혈발생률이 매우 높으며, 임부가 빈혈이면 태아의 건강에 영향을 미칠 뿐만 아니라 미숙아 및 빈혈아를 출산할 가능성이 높게 됩니다. 특히 엽산의 부족은 태아의 신경관 결함이상을 나타나게 할 수 있으므로 임신부의 경우 철분뿐만 아니라 조혈비타민을 함께 보충해주어야 합니다. 산타몬플러스캡슐은 비이온성 3가철복합제인 글루콘산제이철나트륨복염 성분이 함유되어 기존 철분제와 달리 위벽을 자극하지 않으므로 오심·구토 등 위장관부작용이 거의 없으며, 흡수율이 뛰어납니다. 또한, 글루콘산제이철나트륨복염과 조혈비타민 3종(엽산, 시아노코발라민, 엽산피리독신)의 복합처방으로 적혈구의 생성 및 재생을 돕고, 빈혈을 예방·치료하는 최적의 빈혈치료제입니다.

■ **원료약품의 분량** : 이 약 1캡슐 중

글루콘산제이철나트륨복염(KPC)	99.4mg[철(Ⅲ)로서 35mg]
시아노코발라민(약전)	500.0μg
엽산(약전)	500.0μg
엽산피리독신(약전)	50.0mg

■ **성상** : 갈색 내지 적갈색의 분말 및 과립이 들어있는 상·하부 적갈색의 경질캡슐제■ **효능·효과**

1. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
 2. 다음 경우의 비타민 B₆의 보급
 - 임신·수유기
 - 병중·병후의 체력저하시
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 비타민 B₆(엽산피리독신)
- 다음 증상의 완화: 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염

■ **용법·용량** : 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1캡슐씩 식간에 복용합니다.■ **사용상의 주의사항**

1. 경고
 - 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
 - 3) 혈색소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
4. 이상반응
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수
 - 2) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적반응이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
6. 상호작용
 - 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.

- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
나) 레보도파
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ **포장단위** : 30, 60, 120캡슐

■ **첨부문서 작성일** : 2006년 8월 17일

■ **소비자 상담실** : (02)529-6100~9 (교환)312

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

6-8-17

※어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※사용전에 첨부분서를 꼭 읽으십시오.
※기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 회사로 문의하십시오.
※회사 홈페이지 주소 : <http://www.nicepharma.com>
※첨부분서 작성일 이후에 변경된 허가사항은 소비자 상담실 또는 회사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사

본사 : 서울특별시 강남구 도곡동 423-2 ☎ 02)529-6100~9
공장 : 경기도 이천시 신둔면 수광리 486 ☎ 031)634-7100~2