



젠가드에프[®] 캡슐

(제 피아스코르빈산)

잇몸치료제

**사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오.
사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.**

치주질환이란 치아를 유지시켜주는 치아주위조직(잇몸, 치근막, 치조골 등)에 염증을 비롯한 병변이 발생한 경우를 말합니다. 대개 잇몸의 가장 바깥 부위의 염증으로 시작되어 나중에는 하부조직까지 염증상태가 확산되며, 증상이 더욱 심하게 되면 치아가 빠져 버리기도 합니다.

젠가드에프 캡슐은 치주질환을 일으키는 각종 원인균을 살균하고 손상된 잇몸조직의 재생촉진 및 지혈작용을 가지는 성분들이 복합처방되어 있어 치은염, 치조농루등의 치주질환 제증상 완화에 효과적인 잇몸치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 - 1캡슐 중 -

제피아스코르빈산 (KPC)	156mg
(아스코르빈산으로서 150mg)	
카르바조크롬 (KPC)	2mg
염화리소짐 (KPC)	30mg(역가)
50%초산토코페롤 (KPC)(dl- α -초산토코페롤로서 5 mg)	10mg

【성 상】

얇은 주황색 가루가 든 상부 담청색, 하부 암청색의 경질캡슐입니다.

【효능·효과】

잇몸염, 이틀에서 고름이 나는 현상에 의한 여러 증상
(잇몸의 발적(충혈이 되어 붉어짐)·부기·출혈·통증)의 완화

【용법·용량】

성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자분에게는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약 및 화장품등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는환자분
- 2) 다른약물을 투여받고 있는 환자분
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증등)을 일으킨 일이 있는 환자분

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 입맛 없음, 배가거북함, 구역, 구토, 입안염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과 의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막인증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 입안염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킵니다.
- 2) 1개월이상 장기투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과 의사)와 상의 하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고, 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오염을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다

【포장단위】 10, 60, 90, 120, 240캡슐입니다.

【저장방법】 밀폐용기에 실온보관(1~30℃)하십시오.

【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효(사용)기한이 경과 되었거나 유통과정 중 변질, 변패등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 재정경제부고시 (소비자 피해보상규정)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 소비자상담 전화번호 : 080-550-8308~9



주식 **대웅제약**
경기도 안성시 신건지동 54-7

· 설명서 작성년월일 : 2000.03.15
· 설명서 개정년월일 : 2005.03.17
제품의 사용기한은 외부용기에 표기

※ 이 첨부문서 개정년월일 후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.