

※ 사용 전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

치주질환, 잇몸염증의 치료 및 예방

치돌 연질캡슐

(옥수수 불검화정량추출물)

설명-457-01-1

CHIDOL

Soft cap.

일반의약품/분류번호 : 231

치주조직은 치아를 받쳐주는 지지조직으로, 치아에 못지않게 치아의 기능에 중요한 역할을 합니다. 이 치주조직에 염증이 생길 경우 치아의 흔들림, 출혈, 부기, 구취 등이 나타나며 음식을 섭취할 때 일상생활에 큰 불편을 가져옵니다. 연령이 증가함에 따라 치주질환에 의한 치아의 상실이 다른 질환에 의한 것보다 더 큰 비중을 차지하여 치주질환의 관리가 더욱 중요하게 됩니다.

치돌연질캡슐의 주성분인 옥수수 불검화정량추출물(Zea Mays L.)은 치조골 흡수 및 치주인대 파괴에 대한 예방 및 재생효과가 있으며, 치주질환에 개선효과를 나타냅니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중
옥수수 불검화정량추출물(KPC) 35mg
(중스테롤(β -시토스테롤)로서 7mg)

【성상】

황갈색의 점조성 내용물이 든 주황색의 타원형 연질캡슐제

【효능·효과】

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

치주질환 (치아지지 조직질환, 치은염, 치주증(유년형 치주염))

【용법·용량】

성인 : 초기량으로는 옥수수 불검화정량추출물로서 1회 70mg(2캡슐), 1일 3회 식전에 복용합니다.
유지량으로는 1회 35mg(1캡슐), 1일 3회 식전에 복용합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.

2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의하십시오.

3) 임부 및 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에)는 치료 상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 가벼운 완화작용을 일으킬 수 있습니다.

2) 전신 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계로 과민반응을 유발할 수 있습니다.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

10캡슐, 120캡슐, 240캡슐

※ 상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 이상반응이 나타날 수 있습니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월일 : 2007년 5월 25일



청계제약(주)

KGMP
적격업체

경기도 화성시 양감면 대안리 1106-4

소비자 상담실 : 02-554-2639

홈페이지 : www.chunggeje.co.kr