

효과빠른 순수한방염증치로제

월드로신

(은교산)

【원료약품 및 그분량】 1캡슐(510mg)중

금은화(KP)	710mg	연 교(KP)	710mg
박 하(KP)	426mg	길 경(KP)	426mg
감 초(KP)	426mg	담죽엽(생규)	284mg
형 개(KP)	284mg	두 시(생규)	356mg
우방자(생규)	356mg	영양각(생규)	22mg

이상 건조엑스로서 490mg

【성 상】 갈색의 분말이 든 상부 갈색, 하부 미황색의 캡슐제

【효능·효과】 두통, 감기로 인한 인후통, 입이 마르고 기침

【용법·용량】 성인 1일 3회, 1회 2캡슐씩 식전 또는 식후에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상담할 것

- 1) 몸이 허약한 환자
- 2) 위가 약한 환자
- 3) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 4) 심장이나 신장에 장애가 있는 환자
- 5) 부종이 있는 환자

6) 지금까지 약을 복용하면서 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나, 가려움증 등을 일으킨 일이 있는 환자
7) 임신부나 임신 가능성이 있는 환자

8) 현재 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 복용할 때 다음 사항에 주의할 것

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 소아에게 복용시킬 때에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것
- 3) 본 제품은 5세미만의 젖먹이 어린이에게는 복용시키지 말 것

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혀
입이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승,
나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의
측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지
경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

4) 본 제품을 복용함으로써 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나, 가려움증, 오심, 식욕부진, 위부불쾌감
등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.

4. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산)
또는 치아지드계 이뇨제(트리클로로메타치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이
나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

2) 수일간 복용하여도 증상이 호전되지 않을 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.

3) 장기간 계속해서 사용할 경우에는 의사나 약사와 상담할 것

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위



※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원을 통하여
교환하여 드립니다.

20080107



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 논현동 430-1 ☎02)597-1020
<http://www.i-pharm.kr>