



말초성 진해제

레보라진 시럽

레보드로프로피진

분류번호: 222
전문의약품

Levorazine Syrup

【원료약품 및 그 분량】 1포 중

레보드로프로피진(BP).....60mg
파라옥시벤조산메틸(약전).....8mg
파라옥시벤조산프로필(약전).....2mg

【성상】

말기향이 첨가된 무색의 시럽제

【효능·효과】

기침: 급. 만성 기관지염

【용법·용량】

· 성인: 1회 약 10mL, 1일 3회
· 소아: 10~20kg- 1회 약 3mL, 1일 3회
20~30kg- 1회 약 5mL, 1일 3회

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

* 아스파탐 1일 허용량 제한

아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이
하로 조정(가능한한 최소량 사용)할 것. 60kg
성인: 1일 최대복용량 2.4g

【사용상의 주의사항】

- 경고: 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 주여하지 말 것.
- 다음 환자에는 사용하지 말 것.
이 약에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 24개월 미만의 유아
 - 심각한 심부전 환자

4. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
- 3) 순환기계 : 두근거림
- 4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의할 것.
6. 임부 및 수유부와의 사용
임부 및 임신가능자, 수유부에는 투여하지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10mL

* 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2008년 05월 29일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.
첨부문서 개정일 : 2008년 05월 29일



제조사
한국콜마
충남 연기군 전의면 신정리 618-3



제조의뢰자
대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공정:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>

