



흡수가 빠른 빈혈치료제

헤모퀸캡

일반의약품

분류번호: 03220

성분·함량 1캡슐(1,360mg) 중

글루콘산제일철(약전).....	200.0mg
(철로서 23.17mg)	
니코틴산아미드(약전).....	25.0mg
엽산파리독신(약전).....	30.0mg
0.1% 시아노코발라민(KPC).....	10.0mg
(시아노코발라민으로서 10 μ g)	
엽산(약전).....	0.5mg
오로트산(KPC).....	10.0mg
아스코르빈산(약전).....	50.0mg
파라옥시민식황산메칠(약전).....	0.57mg
파라옥시민식황산프로필(약전).....	0.14mg

성상 갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

용법·용량 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐을 식후 복용



※ 그림과 같이 캡슐 포장의 불룩한 부분을 화살표 방향으로 누르고 캡슐만 꺼내 복용합니다. 이때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

효능·효과

1. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
2. 다음 경우의 비타민 B₁₂, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후의 체력저하

사용상의 주의사항

1. 경고
 - 1) 철 함유제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로, 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
 - 2) 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
 - 3) 혈액소조(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
 - 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장에 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
4. 이상반응
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 구역, 구토, 설사, 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 파리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 4) 엽산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10 μ 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperursemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 유행성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의

정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - ① 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - ② 레보도파
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것
7. 임상검사치에의 영향
각종 뇨검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한 외부포장에 표기

포장단위 60캡슐, 120캡슐

※ 이 의약품은 KGMF(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시"소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성일자(2007년 1월 17일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

제조원
알앤피코리아(주)
경기도 화성시 함남면 상신리 900-6

판매원
유한양행
서울시 동작구 대방동 49-6