



콧물, 코막힘, 재채기

캐치코프 정

효과빠른 콧물감기약


중근당

 계열회사
Kyongbo Pharm

10정 일반의약품

■ 원료약품 및 분량 : 1정중

아세트아미노펜(K,P)	500mg
염산페닐에프린(U,S,P)	5mg
말레인산클로르페니라민(K,P)	2mg

■ 성상 : 연한 피란색의 장방형 필름코팅정제
■ 효능·효과 : 감기의 증상상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)

■ 사용상의 주의사항

- 경고

매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야하는 경우 의사 또는 약사와 상의하여야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.
- 다음 환자는 투여하지 말 것.
 - 본제의 개개의 성분에 과민반응이 있는 환자
 - MAO저해제를 복용중인 환자
- 다음 사람은 복용 전에 의사 약사와 상의할 것.
 - 본인 양친 또는 형제 등의 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유행아 및 14세 이하의 어린이
 - 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 눈내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
- 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.
 - 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등.
 - 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것.

의약품분류번호:114

- 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
 - 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.
 - 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전작업을 피할 것.
 - 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 잠기 연용하지 말 것.
 - 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- ※ 본 제품은 우수의약품 제조관리 및 품질 관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다.

CHKT 2007-09

판매원


중근당

 계열회사
(주)경보제약
충남 아산시 신평동 345-6

제조원

(주)인국파비스바이오텍

경기도 안산시 단원구 목내동 456-3


■ 용법·용량

 성인 : 1일 4시각마다 2정씩 복용합니다.
12세 이하의 어린이 : 내과의사와 상담후 복용합니다.

■ 저장방법 : 기밀봉기, 실온(1~30℃)보관


분리배출



8 806110 103820