

시력보호 · 눈의피로 · 눈영양제

아이팜골드 연질캡슐 EYE-Pharmgold Soft Cap.

■ 성 상 : 연한 노황색의 점조성 내용물이 든 암갈색의 연질캡슐

■ 성분 · 함량 : 1캡슐 중

사유(KPC)	296.7mg
팔미탄산레티놀유(KPC)	2mg(비타민 A로서 2,000 I.U.)
에르고칼시페롤(KP)	200 I.U.
동클로로필(별규)	0.3mg

■ 효능 · 효과

1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조감
2. 치골의 발육불량
3. 야맹증
4. 구루병 예방
5. 다음 경우의 비타민A, D의 보급 : 임신 · 수유기, 병중 · 병후 체력저하때, 발육기, 노년기

■ 용법 · 용량 : 15세 이상의 성인 - 1일 1회, 1회 2캡슐 · 7세 이상~15세 미만 - 1일 1회 1캡슐씩 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고 : 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 I.U. 이상을 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 무인에는 비타민 A를 5,000 I.U./일 이상 투여하지 말 것. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 - 피부(가려움), 소화기(오심, 구토)
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우.
3. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000 I.U. 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있다.)
4. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 설사
5. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용시킬 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관 할 것.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃) ■ 포장단위 : 120, 240캡슐

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재경계제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

문안작성일 : 2007. 11. 5



주 | 셀라트팜코리아
경기도 시흥시 대야동 418-21



※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://www.cellart.com>이나 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.