

피부질환 치료제

프러스-지 크림

분류번호 264

프러스지 크림은 급만성 습진, 접촉피부염, 아토피 피부염 등 각종 알레르기성 염증성 피부질환 및 2차감염된 피부질환의 국소치료에 사용됩니다.

▶성분·함량 : 1g 중	
길초산 베타메타손(KP)	0.61mg
황산겐타마이신(항기)	1.0mg(약가)
파라옥시안식황산메칠(KP)	1mg
파라옥시안식황산프로필(KP)	1mg

▶성상 :
전질균등한 백색의 크림제

▶효능·효과 :
• 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환 : 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순태선, 간찰진, 박탈피부염, 가려움, 건선
• 1도 화상

▶용법·용량 :
1일 1~3회 환부에 적당량을 바릅니다.

▶사용상의 주의사항

- 다음 환자(부위)에는 투여하지 마십시오.
 - 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·스피로헤타속·효모·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등)·동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있습니다)
 - 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 고막천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유 지연이 나타날 수 있습니다)
 - 케양(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있습니다)
 - 입주위피부염, 보통여드름, 주사(rosacea)환자
 - 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글리코사이드계 항생물질 또는 바시트라신에 의한 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 다음의 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
 - 유·소아
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 부작용
 - 피부
 - 감염증: 피부의 세균성(전염성농가진, 모낭염 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있습니다(밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽습니다). 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제등을 병용하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지합니다.
 - 일반적 피부증상: 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통, 발열, 작열감, 발진·발적, 홍조, 피부건조, 농포성피부염, 따개비, 상처악화, 욕창, 농포증 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 장기연용: 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관 확장, 자반), 스테로이드성 주사, 입주위피부염(입주위·안면전체에 홍반, 모세혈관확장, 딱지, 인설), 어린선(漁鱗癬)양 피부변화, 다모, 색소탈실 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용합니다.
 - 내분비계: 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신투여와 같은 뇌하수체·부신피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의합니다.
 - 눈: 안검 피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의합니다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후방하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있습니다.
 - 균교대현상: 드물게 이 약에 대하여 비감수성균에 의한 감염증을 일으킬 수 있

으므로 이러한 경우에는 사용을 중지합니다.

5) 신장애, 난청 등이 나타날 수 있으므로 장기 연용을 피합니다.

4. 일반적주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.

2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용합니다.

3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에게 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(HPA)축의 억제, 쿠싱증후군, 과혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사합니다.

4) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 활성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복됩니다.

5) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지합니다.

6) 증상이 개선 되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지합니다.

7) 대량, 장기간, 광범위하게 특히 밀봉봉대법을 사용함으로써 코르티코이드제를 전신적으로 투여한 경우와 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 특별한 경우를 제외하고는 장기, 대량사용 및 밀봉봉대법을 피합니다.

8) 감작할 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작징후(발적, 부종, 구진, 소수포 등)가 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.

9) 장기 연용 하지 않습니다.

10) 코르티코이드 및 겐타마이신은 밀봉봉대법 또는 광범위한 부위 적용, 장기연용 등으로 인해 피부를 통해 흡수된다고 알려져 있습니다. 이러한 경우에는 정기적인 관찰 및 치료에 앞서서 BUN 검사등을 통한 신기능 검사가 권장됩니다.

11) 겐타마이신 국소투여시 전신적인 효과가 나타나지 않지만, 전신독성을 나타낼 수 있는 농도에서는 신부전환자 또는 제8뇌신경환자에서는 영구적인 前庭 기능 장애의 원인이 될 수 있습니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

2) 국소적으로 투여된 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드가 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여시 주의합니다.

6. 소아에 대한 투여

1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타날 수 있으므로 주의합니다.

2) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의합니다.

3) 소아환자에게 사용할 경우에는 치료효과를 나타내는 최소 양만을 사용합니다.

7. 적용상의 주의

1) 안과용으로 사용하지 않습니다.

2) 화상이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않습니다.

3) 의사의 감독없이 밀봉봉대법을 사용하지 않습니다(특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용 전에 환부를 청결히 합니다).

8. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

9. 기타

건선환자에 장기, 대량 사용할 경우에는 치료 중 또는 치료중지 후에 건선성 홍피증, 농포성 건선 등이 나타난다는 보고가 있습니다.

▶ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

▶ 포장단위 : 자사포장단위

▶ 사용기한 : 외부포장 참조

■ 본 제품은 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 약품은 교환하여 드리오니 담당사원을 통하여 제사로 송부하여 주시기 바랍니다. (한국약품(주))

• 소비자 상담실 TEL.(02)3289-4253~9 • 수신자부담 080-001-4125

* 이 첨부문서 작성일자(2007년 7월 30일)이후 변경된 내용은 (홈페이지)나 (전화번호)에서 확인할 수 있습니다.

AG070730



건강의 동반자

인국약품(주)

• 본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75 • 공장: 경기도 화성시 향남읍 상신리 903-2