



잘트론정

잘트프로펜

분류번호:114
전문 의약품

Zaltron Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

잘트프로펜(백구).....80mg

•유당(기원 : 소 사용 : 유유)

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 다음 질환 및 증상의 소염 진통: 만성관절류마티스, 변형성관절증, 요통증, 견관절주위염, 견관절완충근
2. 수술후, 외상후 및 발치후의 소염 진통

【용법·용량】

통상, 성인에 잘트프로펜 1회 80mg, 1일 3회 경구투여한다.
단회투여의 경우는, 1회 80-160mg을 경구투여 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 1) 매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제에 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
 - 2) 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 특성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발생하는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다.
 - 3) 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 고통 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 중증의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 소화성 궤양 환자
 - 2) 중증의 혈액이상 환자
 - 3) 중증의 간장애 환자
 - 4) 중증의 신장애 환자
 - 5) 중증의 심기능부전 환자
 - 6) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
 - 7) 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기, 말초혈관 반응 및 그 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 치명적인 중증의 아나필락시스 반응이 드물게 보고되었다.)
 - 8) 관상동맥 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료 수유부
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 소화성 궤양의 병력이 있는 환자
 - 2) 혈액 이상 또는 그러한 병력이 있는 환자
 - 3) 간장애 또는 그러한 병력이 있는 환자
 - 4) 신장애 또는 그러한 병력이 있는 환자
 - 5) 심기능장애 환자
 - 6) 과민증의 병력이 있는 환자
4. 이상반응
 - 1) 소화기계 : 때때로 위불쾌감, 위통, 구토기, 심약부통, 구내염, 구역, 설사, 복통, 위증압감, 구토, 속쓰림, 식욕부진, 변비 등이 보이는 것이 있다.
 - 2) 정신신경계 : 때때로 두통, 졸음기, 졸림 등이 보이는 것이 있다.
 - 3) 과민성 : 아나필락시스 양 증상(가려움, 홍조, 안면부종, 두드러기, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 필요에 따라 적절한 처치를 한다. 때때로 발진, 피진, 습진이 나타날 수 있다.
 - 4) 혈액 : 때때로 적혈구감소, 헤모글로빈감소, 헤마토크리터저하, 호산구증가, 백혈구증가, 혈소판증가 등이 보이는 것이 있다.
 - 5) 간장 : 때때로 ALT, AST, ALP, γ -GTP 등이 상승이 보이는 것이 있다.
 - 6) 신장 : 때때로 BUN, 혈중 크레아티닌의 상승이 보이는 것이 있다.
 - 7) 기타 : 때때로 부종, 관태강 등이 보이는 경우가 있다.
5. 일반적 주의
 - 1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다.
 - 2) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아니고 대증요법인 것에 유의한다.
 - 3) 만성 질환(만성관절류마티스, 변형성관절증 등)에 대해 이 약을 사용한 경우에는, 다음 사항을 고려한다.
 - ① 이 약을 정기간 투여하는 환자는 정기적으로 임상검사(노검사, 전혈구 검사(CBC) 및 이화학적 검사 등 혈액 검사, 간기능 검사 등)를 실시하고 이상이 인정된 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발현되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - ② 약물요법 이외의 요법도 고려한다.
 - 4) 급성 질환에 대해 이 약을 사용할 경우에는 다음의 사항을 고려한다.
 - ① 급성 염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
 - ② 원인으로 해서 동일한 약제의 장기투여를 피한다.
 - ③ 원인요법이 있으면 이것을 행한다.
 - 5) 환자의 상태를 충분히 관찰하고, 이상반응의 발현에 유의한다.
 - 6) 이 약의 약리학적 특성상 염증의 다른 증상과 징후를 불완전화하여 통증을 비 바람직성 조건에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다. 이 약을 감염에 의한 염증에 대해서 사용한 경우에는 적절한 항균제를 병용하여, 관찰을 충분히 하고 신중하게 투여한다.
 - 7) 위장관계 이상반응 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여시 관찰 또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 중시시키는 다른 위험인자로는 장구증, 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용, 알콜 섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 예방적 보고의 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에게는 이 약을 투여시 특별한 주의하여야 한다.
 - 8) 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유효해사율의 발생률이 증가될 수도 있다. 치아치환이뇨제 또는 무투형 이뇨제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다.



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공정:김영도 회장 김희승 이사인리 308
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품

- 9) 율혈성심부전 및 부종: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 체액 저류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 체액저류 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다.
- 10) 비스테로이드성 소염진통제를 장기복용 시 신장기능이 저하될 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 신기능 부전 환자, 긴기는 부전 환자, 이뇨제나 ACE 저해제를 투여 중인 환자, 고령자 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 투약을 중단하여 대부분 치료 전 상태로 회복된다.
- 11) 진행성 신질환: 진행성 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진행성 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 개시해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다.
- 12) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 긴기는 수치의 상승이 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료와 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 혈당, 치명적 전격성 간염, 간사상, 간부전(일부는 치명적일)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 긴기는 이상을 암시하는 증상 및 또는 징후가 있는 환자 또는 긴기를 시험 결과 비정상인 환자에 있어서는 투여기간 동안 주의감에 신장기능의 악화 여부를 관찰하고 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발견되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.
- 13) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 해모글로빈 또는 헤마토크리트 검사를 해야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지속기간이 짧으며 가역적이다. 오피오이드 진통제와 같이 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링을 받아야 한다.
- 14) 아나필락시스양 반응: 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시스양 반응은 약물에 노출된 경향이 없는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특이적 반응을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 잠재적으로 치명적인 중증의 기관지 경련을 나타내는 전신 환자에게 전형적으로 발생한다. 이러한 아나필락시스양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시해야 한다.
- 15) 피부반응: 이 약은 탈락성 피부염, 스티븐스 존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이를 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 환자 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 발현 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 한다.
- 16) 천식 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있다. 아스피린 민감성 전신 환자에서 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자에서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지경련을 포함하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에서는 투여하지 않도록 하며, 전신 환자에서는 주의감에 사용해야 한다.
- 17) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍 증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드 - 반응성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용한 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.

6. 상호작용

- 1) 다른 소염진통제와의 병용은 피한다.
- 2) ACE 저해제: 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 저해제의 항고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE 저해제를 병용투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 한다.
- 3) 아스피린: 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전반응의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다.

- 4) 프로세미드: 임상시험 및 시판후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프로세미드 클린링 합성 억제에 의해 일부 환자에서 프로세미드 및 치아지제 이노제의 나트륨노배설 효과 감소될 수 있음이 확인되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 한다.
- 5) 리튬: 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로세미드 클린링 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰해야 한다.
- 6) 메트отреキサ이트: 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 메트отреキサ이트의 독성이 증가될 수 있으므로 두 약물을 병용투여하는 경우 주의하도록 한다.
- 7) 와파린:
 - 1) 랫드의 실험에서 와파린의 항응혈작용을 증가하기 때문에 이것들의 약제와 병용하는 경우는 신중하게 투여한다.
 - 2) 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다.
 - 3) 랫드의 실험에서 톨루타미드의 혈당강화작용을 증가하기 때문에 이것들의 약제와 병용하는 경우는 신중하게 투여한다.
 - 4) 마우스의 실험에서 피라독카르본산계 항균제 에녹사시린의 병용으로 잘못포로펜을 고농량 투여한 경우, 경련을 유발하는 것이 있기 때문에 신중하게 투여한다.
7. 임부에 대한 투여
 - 1) 임신알기의 랫드에 필요한 실험에서 태아의 동맥관수축이 보고되어 있다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 알기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있으므로 이 약은 임부(특히 임신 말기)에게 투여를 피해야 한다.
 - 2) 랫드에 대한 실험에서 비스테로이드성 소염진통제는 프로스타글란딘 합성을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난소의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 새끼의 생존율을 감소시켰다.
 - 3) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립하지 않았기 때문에 임신 할 가능성이 있는 부인에 치료상의 유익성이 위험성을 상회한 다고 판단되는 경우에만 투여한다.
8. 수유부에 대한 투여

동물실험에서 유전 이동이 보고되었기 때문에, 수유중의 부인에는 투여하지 않는다.
9. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안정성은 확립되어 있지 않다.
10. 고령자에 대한 투여

고령자에서는 이상반응이 보이기 쉽기 때문에, 투여간격에 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중하게 투여한다.
11. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
12. 기타

동물을 이용한 생식독성시험결과 랫드의 수태는 및 일반생식독성 시험에서 20mg/kg/day 이상 투여시 착상수와 착상전소실의 증가와 생존태자수의 감소 태반무게의 증가가 나타났다. 주산/수유시 시험에서 30 mg/kg/day 투여시 착상수와 출생자수의 유의적 감소가 나타났고, 수유기에 모동물의 소화기관 장애로 인한 포육률 감소로 착상자의 체중감소가 관찰되었으며, 착상자의 생식능 검사에서 출생자수가 유의적으로 감소하였다.

【포장단위】 30정, 500정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- * 본 제품은 "의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질관리를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약물을 통신판매에 교환하여 교환하십시오.
- * 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2008년 01월 24일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대체제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일자: 2008년 01월 24일