

기침감기약 블루콜 연질캡슐

기침 • 가래 • 인후통

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(750mg) 중	
guaifenesin(약전)	82.00mg
염산수도페드린(USP)	30.00mg
브로마수소산덱스트로메토르판(약전)	16.00mg

【성상】

무색 내지 연한 청색의 내용물을 함유한 진한 청색의 투명한 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

감기의 증상상(기침, 가래, 인후통, 콧물, 코막힘, 재채기, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

성인 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성파부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
 - 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것
 - 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피한다.
 - 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 장기연용하지 않는다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여한다.
 - 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
- 상호작용
이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
: 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보존한다.
 - 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10연질캡슐

【사용기한】 제조일로부터 24개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 재정경제부고시 소비자 피해보상규정에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-784-7800

작성일 : 2006. 09

RP 경기도 화성시 향남면 삼성리 908-6
알앤피코리아(주)
최대응제약 계열사