

일반의약품
 <과립> 분류번호: 263
 <정> 분류번호: 263

원진 排膿散反湯

우수의약품
KGMP
 적격업체 제품

엑스과립 · 정

배농산금탕(排膿散及湯)은 대표적 고방(古方)중의 하나인 금체요략(金匱要略)에 소개된 배농산과 배농탕을 합방한 처방으로 각종 화농증 즉 염증으로 발적(發赤) 종창(腫脹) 동통(疼痛)할때나, 배농시 또는 배농후의 육아발생 촉진 등에 두루 쓰인다.

처방구성주의 배농산은 지실, 작약, 길경의 독특한 협동작용에 의하여 화농시 깊이 끓고 배농이 잘되지 않을때 주로 쓰이는 처방이며, 배농탕은 화농증의 초기 또는 화농의 왕성한 시기를 지난뒤 농이나 분비물이 나올때 쓰이는 처방으로, 이 두가지 처방을 합방하여 사용함으로써 각종 염증에 두루 사용할 수 있도록 개발한 과학화된 한방약이다.

【원료약품 및 그 분량】

<원진 배농산금탕 엑스과립> 1포중

주성분 : 배농산금탕건조엑스(별규).....	850mg
지 실(약전)	1.00그램
작 약(약전)	1.00그램
길 경(약전)	1.33그램
견 강(약전)	0.33그램
대 추(약전)	1.00그램
감 초(약전)	1.00그램

<원진 배농산금탕정> 1정중

주성분 : 배농산금탕건조엑스(별규).....	425.3mg
지 실(약전)	500밀리그램
길 경(약전)	670밀리그램
작 약(약전)	500밀리그램
견 강(약전)	165밀리그램
대 추(약전)	500밀리그램
감 초(약전)	500밀리그램

【성상】

<엑스과립> 황갈색의 과립제 <엑스정제> 담갈색의 장방형 필름제과립

【효능·효과】 발적 종창하여 단단해지고 동통을 수반하는 화농증

【용법·용량】

<엑스과립> 보통성인 1일 3회, 1회 1포(3.0그램)~2포(6.0그램)씩 식전 또는 식간 복용

<엑스정제> 보통성인 1일 3회, 1회 2~4정씩 식전 또는 식간 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 사용하지 말것.

- 1) 발적, 종창, 동통증의 국소증상 이외에 두통, 오한, 발열등의 전신증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성종양, 만성종양환자

2. 이상반응

전해질대사 : 장기연용에 의하여 저칼륨혈증의 혈압상승, 나트륨체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스 테론증이 나타날수 있으므로 주의하여 사용하며 이상이 나타났을 경우에는 중지할것.

또 저칼륨혈증의 결과로서 근경련이 나타날 수 있다.

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본체의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증: 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감소함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 지아지드제 이뇨제(트리클로르메타지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

· 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위



한국웨일즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4

소비자상담실: 031)494-5995

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변색 또는오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 이 첨부문서 작성일(WA05701) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.

㉠ 투약의 포인트

1. 본방은 가벼운 염증은 삭혀주고, 발적하여 화농된 부위는 터뜨려서 배농시켜주는 작용이 있으므로 화농증의 초기서부터 농이 나온후 상처가 아무는 때까지 두루 사용된다.
2. 화농부위가 깊을때는 항생제나 설파제만 사용하지 말고 본제를 병용하여야 원상조직 복구가 빠르며, 본제와 소염제를 병용할수도 있고 고약과 본제를 병용하여도 좋다.
3. 목이 아픈 감기나 인후염, 편도선염, 유방염, 임파선염, 치루, 항문주위염등에 잘 들어며 국소적으로 열감이 있을때는 황련해독탕으로 해열시키면서 본제를 병용하면 효과가 빠르다.
4. 본제는 기(氣)를 하강 또는 발산시키는 작용이 있어서 축농증, 치은염, 치조농루, 중이염등에도 잘 들어며, 이때 리소짐정 기타 소염제와 병용하면 효과가 빠르다(이럴때 선인들은 계란 노른자와 병용했음).
5. 안검염(눈다래끼)에 항생제를 사용하면 딱딱한 채로 낫는수가 있으므로 이때는 본제와 호소소염제를 병용하거나 완전 화농시까지 투약을 보류하여야 한다.
6. 화농부위가 체표 특히 안면부에 있을때 잘들지만 대변에 농이 섞여 나올때나 질은 가래를뱉거나 농혈을 토할때도 사용된다.
7. 배농이 된후 육아발생이 잘 안될때는 당뇨등 다른증세를 일단 의심해 보아야 하며 이런때는황기건중탕등을 병용하거나 자운연고등을 병용하면 육아발생이 촉진된다.