

코올드정

■원료약품 및 분량 1정(688.5mg) 중

아세트아미노펜(KP).....	500mg
슈도에페드린염산염(BP)	30mg
클로르페니라민말레산염(KP).....	2mg

■성상 흰색의 장방형 필름코팅정제

■효능·효과

감기의 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

■용법·용량

성인 및 12세 이상의 어린이 : 매 6시간마다 2정 복용, 최대 하루 8정을 초과할 수 없다.

■사용상 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 하고, 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람)

2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

1) 본인, 양친, 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기등을 일으키기 쉬운 체질을 가지고 있는 사람

2) 지금까지 이 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.

3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이

4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.

5) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람.

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

4. 복용시 다음 사항을 주의할 것

1) 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.

· 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등.

3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다는 보고가 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.

(1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

(2) 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우

(3) 천식이 나타난 경우

6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.

3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

4) 장기 연용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■사용기간 제조일로부터 36개월

■포장단위 10정

※ 의약품은 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.kr>)→정보마당→의약품등 정보를 참조하여 주십시오.

작성연월일: 07. 11. 12

제조판매자



(주)한국코스제약

충북 제천시 강재동 253-12