

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

주성분 : 아세트아미노펜(KP)	325.00mg
구아이페네신(KP)	80.00mg
클로페니라민말레산염(KP)	2.00mg
수도페드린염산염(USP)	30.00mg
덱스트로메토르판브로모화수소산염수화물(KP) ..	10.00mg

착색제 : 황색5호, 청색1호 (KPTaCS) 적량

[성상] 미색 내지 갈색의 투명한 내용물을 함유한 갈색의 투명한 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

감기의 증상(코막힘, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지 천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 복내장(예 : 뇌의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배도곤란이 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고 되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 삼합계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피한다.
- 3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 정기연용하지 않는다.
- 6) 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여한다.
 - 3) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부적당한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
7. 상호작용 : 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다. : 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 적시광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보존한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.

이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com)나 제품상담전화화를 통해 확인할 수 있습니다.

본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

자세한 사항은 '이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)'의약품 정보를 참조하십시오.


2008. 5. 7 작성

2009. 12. 1 개정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 10캡슐



본 제품은 어린이 보호용 안전
포장을 사용하고 있습니다.

복용시,

① 가위 등으로 절취선을 따라
자르십시오.

② 접착이 안된 화살표부분을
잡고 화살표 방향으로 떼어
낸 후 복용하십시오.