

[저장방법 및 사용기간]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 3년

[판매자]



[제조자]

(주)한국코러스제약

충북 제천시 강제동 253-12

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이지드릭 (<http://ezdrug.kida.go.kr>) 의약품정보를 참조 하십시오.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



20정

일반의약품

분류번호: 234

정부공인


KGMP

우수약품지정업체

위통·속쓰림에 효과빠른 위장약

랜시드정


- 위염·십이지장궤양 치료제
- 강력한 위산분비 억제
- 빠른효과
- 지속적인 작용
- 3 Antacids+Ranitidine



위통·속쓰림·소화불량·구역

랜시드정

위통·속쓰림에 효과빠른 위장약



Ranitidine



종근당

[원료약품 및 분량] 1정 360.76mg 중

라니티딘염산염(USP)	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)	
산화마그네슘(KP)	50.0mg
규산알루미늄산화마그네슘(USP)	125.0mg
(Al ₂ O ₃ 로서 38.31mg, MgO로서 30.13mg)	
수산화알루미늄산화마그네슘(KPC)	100.0mg
(Al ₂ O ₃ 로서 30mg, MgO로서 30mg)	

첨가제 : 유당수화물(네덜란드 소, 우유)

[성 상] 흰색의 원형필름코팅정

[효능·효과] 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

[용법·용량] 성인(15세이상, 80세미만) : 1회 2정씩 복용
하되 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면
다시 2정을 복용하십시오.
단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

[사용상의사항] 1) 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자(혈액질환, 신장·간장질환, 위십이지장질환, 천식·류마티스 등
의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이
처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.) 2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자(스테로이드제, 항생물질, 항암제,
아졸계 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이
처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.) 3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상성의 병력
이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.) 4) 히스타민 H₂-수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람 5) 소아(15세미만) 및 고령자(80
세이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며 노인에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져
약효가 강하게 발현될 수 있습니다. 6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부(임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니
티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오. 7) 투석요법을 받고 있는 환자 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으
므로, 갈락토제 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-
galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하면 안 된다. 2) 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 의사의 진료를 받고 있는 환
자 또는 다른 약제를 복용중인 환자(약물상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다. 2) 약물의 인종·민족의 병력이
있는 사람 3) 고령자(65세이상) 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기는 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다. 4) 인후통, 기침 및
고열이 있는 환자(심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소등의 혈액이상성이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본제의 복용에 의해 증상이 악화
되거나 이 약의 부작용은 문제시될 수 있습니다. 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자(원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다. 6) 복통이 지속
되고 있는 환자(원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다. 3) 부작용 : 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있습니다. 이러한
경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 1) 알레르기증상(발진, 발적, 가려움, 부종, 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근
육통 등의 증상이 나타나는 경우(원인:라니티딘의 부작용 중상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.
2) 이 약의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 소변이 차가워지며, 식은땀, 속만부, 구역이 나타나는 경우 3) 고열을 동반
한 발진, 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우 4) 목의 통통, 발열, 권태감, 얼굴과 눈지름의 안쪽이
알게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(치창의 출혈, 비출혈 등이 나타나는 경우 5) 황달 4) 알반적인 주의 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경
우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오. 2) 2주간을 초과하여 연속하지 마십시오. 3) 이 약을 복용
할 때에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수 있음) 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사
또는 약사와 상담하십시오. 5) 기저된 호르몬의 중상에는 복용하지 마십시오. 6) 장기연용을 하지 마십시오. 7) 신장병의 병력이 있는 환자는 복
용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오. 5) 상호작용 : 1) 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다. - 테트라
사이클린계 항생물질(테트라사이클린등) - 5-뉴클로젠계 항균제(오픈록사민 등) 2) 이 약을 다른 위장약과 병용하지 마십시오. 다른 위장약을 동시
에 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다. 6) 일부 또는 임신
하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부(임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모
유중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 수유하지 않도록 주 의하십시오. 7) 소아에 대한
투여(소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.) 8) 고령자에 대한 투여(65
세이상) 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기는 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하
십시오. 9) 장상장애 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선이나 고
온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 오용을 피하고, 품질을 보호·유지하기
위해 다른 용기에 넣지 마십시오. (작성일: 2012.09.10)



8 806472 018527