

관절염 · 근육통에 바르는 소염(항염)진통제

삼진 피록시카겔

삼진피록시카겔은 진통, 소염(항염), 해열작용을 나타내는 피록시카를 주성분으로 하는 겔타입의 외용제로 끈적끈적하지 않고 시원한 느낌을 주며 신속하게 피부에 흡수되어 퇴행성관절염, 어깨관절주위염, 건(힘줄) · 건초염(힘줄윤활막염), 건(힘줄)주위염, 테니스 엘보우, 근육통, 외상(상처)후 종창(부기) · 동통(통증)과 같은 질환이나 증상에 진통 · 소염(항염)효과를 나타냅니다. 또한 **삼진피록시카겔**은 경구제로부터 야기되는 소화관장애와 같은 전신적인 부작용이 적은 제제입니다.

■ 원료약품의 분량 : 1g 중

피록시카(USP) 5mg
보존제 - 파라옥시벤조산메틸(KP)..... 1.8mg, 파라옥시벤조산프로필(KP)..... 0.2mg

■ 성 상 : 에탄올 냄새가 나는 황색 투명한 겔제이다.

■ 효능 · 효과

다음 질환 및 증상의 진통 · 소염(항염) : 퇴행성 관절염(골(뼈)관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄) · 건초염(힘줄윤활막염), 건(힘줄)주위염, 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통(근(근육)염, 근(근육)막염 등), 외상(상처)후의 종창(부기) · 동통(통증)

■ 용법 · 용량

성인 : 1회 1g(약 3cm) 1일 3~4회 환부(질환 부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지른다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 피록시카 제제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 천식(스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(중증(심한 증상) 천식발작을 일으킬 수 있다.)
- 3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 두드러기, 비염(코염) 및 맥관부종(혈관부기)을 일으킨 환자
- 4) 14세 이하의 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.


- 1) 기관지 천식 환자(중증(심한 증상) 천식발작을 일으킬 수 있다.)
- 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 피부 : 때때로 국소의 가려움증, 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 인설(비늘), 습진 · 피부염, 접촉 피부염, 홍반, 드물게 광과민증이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 심할 경우에는 사용을 중지한다.
- 2) 장기간 또는 과량 투여시 전신부작용으로 구역, 위장관 불쾌감, 호흡곤란, 신부전(신장기능 상실) 및 신(신장)증후군환자에서의 급성 간질성 신염(신장염)이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의한다.
- 2) 피부감염증을 불현성(증상이 나타나지 않는)화시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 복용)하고 충분히 관찰하여 신중히 투여한다.



- 3) 만성질환(퇴행성관절염(골(뼈)관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의한다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신 3기 : 프로스타글란딘 합성 저해(억제)로 인해 출산이 지연될 수 있으며 출산시 실험, 신생아 출혈, 태아의 심폐독성(폐동맥 고혈압)(동맥관 조기폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 신(신장)기능저하로 양수과소증을 수반하는 신부전(신장기능상실) 등이 나타날 수 있으므로 이 시기의 임부에는 사용하지 않는다.
 - 2) 임신 1기 및 2기 : 동물의 생식실험 결과 태아독성은 발생하지 않았으나 임부에 대한 연구는 아직 밝혀진 바 없다.
 - 3) 피록시카를 경구투여(복용)한 후 혈중 농도의 약 1%가 모유에서 발견되었다. 모유에서의 주성분 농도와 임상적 관련성은 아직 밝혀진 바 없으나 수유부에는 투여하지 않는다.
6. 소아에 대한 투여
미숙아, 신생아, 영아(갓난아기), 유아 및 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.
7. 고령자(노인)에 대한 투여
고령자(노인)에는 부작용의 발현(드러냄)에 특히 주의하고 필요한 최소한의 투여로 한정하는 등 신중히 투여한다.
8. 적용상의 주의사항
 - 1) 병변이 있는 피부 (출혈성 피부질환, 습진, 감염된 병변, 화상, 상처), 눈 및 점막 부위에는 사용하지 않는다.
 - 2) 밀봉봉대용으로 사용하지 않는다.
 - 3) 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시적인 자극감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.

■ 포장단위 : 50g

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 주 의

1. 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 2. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 3. 사용중 중간에 공기가 찬 부분이 나올 수 있으나, 중량에는 문제가 없습니다.
 4. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 5. 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 옮겨 담지마시고, 뚜껑을 꼭 단아서 보관하십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 11월 6일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자상담실(수신자부담전화 080-082-1234)을 통해서 알 수 있습니다.

11009
PRM-03-08-1171