

서방성 위장관운동조절제

메리톤 서방정

(트리메부틴말레산염)

원료약품의 분량: 1정 중

트리메부틴말레산염(KPC) 300mg

성 상: 흰색의 달걀형 필름코팅정제

효능효과

위·식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장궤양 등에 수반되는 동통, 소화불량, 구역, 구토, 기능적결장질환(과민성대장염, 경련성결장), 유소아의 습관성구토, 비감염성의 장관통과기능장애(설사, 변비), 유소아의 동요, 자극 수면장애, 소화관수술후의 장폐색, 엑스선(내시경)검사시의 유문 및 결장경련의 완화

용법용량

1일 2회 1회 1정 공복시 복용

사용상의 주의사항

1. 다음 경우에는 신중히 투여할 것

- 1) 동물시험에서 최기형성은 없었으나 임신 중 사용에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 후 첫 3개월 동안 및 수유기 때의 투여는 피하는 것이 바람직하다.
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 부작용

드물게 피로감, 열작감이나 한기, 가벼운 설사, 구역, 구토, 변비, 소화장애 및 약간의 최면상태, 경미한 현기증이 나타날 수 있다.

저장방법: 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

포장단위: 30정, 300정

사용기간: 제조일로부터 24개월

※이 설명서 작성개정 년 월 이 후 변경 된 내용은 홈페이지 (www.hawonpharm.co.kr) 의 제품정보를 통해 확인하십시오.

※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요 또는 “이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 개정년월 2010.03

제 조 자 : (주)뉴젠팜 / 전북 익산시 석암동 649

제조외화자 :



하원제약

경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3

<http://www.hawonpharm.co.kr>