

■ 원료약품의 분량 1mL 중

염산푸르셀티아민(KP) 5.46mg
(푸르셀티아민으로서 5mg)

■ 성 상

이 약은 무색의 무취와 약간의 고미를 가진 액체로서 갈색의 앰플에 충전된 투명한 액체임.

■ 효능·효과

1. 비타민 B1 결핍증의 예방 및 치료
 2. 비타민 B1의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급(소모성 질환, 갑상선 기능 항진증, 임신부, 수유부, 격렬한 육체 노동시 등)
 3. 베르니케 뇌증(Wernicke encephalopathy disease)
 4. 각기 충심
 5. 아래와 같은 질환가운데, 비타민 B1의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우
 - 1) 신경통
 - 2) 근육통, 관절통
 - 3) 말초 신경염, 말초 신경 마비
 - 4) 심근 대사 장애
 - 5) 변비 등의 위장 운동 기능 장애
 - 6) 수술 후 장관 마비
 - 7) 중추신경장애(척추염, 뇌혈관장애)
- 비타민B1 결핍의 예방과 치료, 비타민B1의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분할 시의 보급, 베르니케 뇌증, 각기충심 이외의 효능·효과에 대하여 효과가 없는데 산만하게 사용해서는 안된다.

■ 용법·용량

푸르셀티아민으로서 통상 성인 1일 5~100mg을 피하근육내 또는 정맥내에 주사한다.

■ 사용상 주의사항

1. 금기(다음의 환자에게는 투여하지 않음)
본 제제의 성분에 대해 과민증의 경력이 있는 환자
2. 신중투여(다음의 환자에게는 신중하게 투여할 것)
약물과민증의 경력이 있는 환자
3. 부작용
 - 1) 중대한 부작용
쇼크를 일으키는 일이 있기 때문에 관찰을 충분히 하고 혈압저하, 가슴 통증, 호흡곤란 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 그 외의 부작용
 - (1) 과민증 : 발진등의 과민증상이 나타나는 일이 있으므로 증상이 나타날 때에는 투여를 중지한다.
 - (2) 소화기 : 오심, 구토, 설염, 설사
 - (3) 기타 : 두통, 빈뇨
4. 적응상의 주의
정맥내 주사에 의해 혈관통증을 일으키는 일이 있기 때문에 주사속도는 가능한 한 천천히 할 것

■ 취급상의 주의사항

1. 주사액 사용시의 일반적인 주의로서, 세균등에 의한 오염을 피하기 위해 일부 사용후의 잔액은 사용하지 않음.
2. 앰플 컷
본 제제는 원포인트 컷 앰플을 사용하고 있으므로, 앰플 머리 부분의 마크를 위로 해 반대측(아래쪽 방향)에 가볍게 힘을 더해 컷을 할 것. 덧붙여 앰플을 자를 때 이물 혼입을 피하기 위해, 뒷부분 주위를 에탄올 면 등으로 닦아서 깨끗이 할 것.

■ 저장방법

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관