

한방 종창/화농증 치료제

한신 마로이신

캡슐

일반의약품

분류번호 : 263

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그분량】 1캡슐(500mg)중.

길 경(약전)	0.67g
감 초(약전)	0.50g
대 추(약전)	0.50g
작 약(약전)	0.50g
견 강(약전)	0.17g
지 실(약전)	0.50g

이상 수침건조 엑스 405mg임.

【성 상】 암갈색의 분말이 충전된 상·하부 적자색의 캡슐제.

【효능/효과】 발적, 종창하여 단단해지고 동통을 수반하는 화농증.

【용법/용량】 성인 1일 3회, 1회 2~4캡슐씩 식전 또는 식간에 복용.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것.

- 1) 발적, 종창, 동통의 국소증상 이외에 오한, 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성농양, 만성농양환자

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분

히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

4. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제 (푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.(사용후 반드시 밀폐 보관할 것)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

【저장방법/사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월.

【포장단위】 10캡슐, 10캡슐×40EA.

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



주식
회사

한

국

신

약

본사/공장 : 충남 논산시 양촌면 중산리 805-15 TEL : (041)740-2345
<http://www.hsp.co.kr>

08052004