

전문의약품

분류번호 : 214

고혈압 및 전립선비대증 치료제

한올

메실산독사조신정

2mg

Doxazosin Mesylate

한올 메실산독사조신정은 α_1 -수용체차단제로서 고혈압 및 BPH를 동시에 치료합니다. 하지만, 정상혈압의 BPH 환자에서는 혈압변동이 없어 더욱 우수한 제제입니다. 뛰어난 치료 효과뿐 아니라 인슐린, 지질대사까지 탁월하게 개선시키며 안전성 또한 뛰어나 여러 합병증을 지닌 고혈압이나 BPH 환자에게 안심하고 사용합니다.

■ 원료약품의 분량 : 1정중

메실산독사조신 (별규).....2.43mg
(독사조신으로 2.0mg)

■ 성상 : 백색의 장방형의 정제

■ 효능·효과

고혈압, 양성전립선비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애

■ 용법·용량

성인

1. 고혈압 : 메실산독사조신으로서 초회량으로 1일 1회 1mg을 경구투여하며 환자의 반응에 따라 1주후부터 2mg으로 증량하여 투여합니다. 혈압을 원하는 상태로 조절하기 위해 1-2주 간격으로 1일 4mg, 8mg, 16mg으로 천천히 증량할 수 있습니다. 이 약 단독으로 혈압조절이 어려울 경우에는 치아짓게 아노제 또는 β -차단제와 병용투여할 수 있습니다.

2. 양성전립선비대에 의한 뇨폐색 및 배뇨장애 : 초회량은 1일 1회 1mg이며 환자의 혈압상태에 따라 1-2주간격으로 1일 용량을 2mg으로 증량할 수 있으며 점진적으로 4mg, 8mg까지 투여할 수 있습니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고 1) 실신, 초회투여효과 : 다른 α_1 -길항제와 마찬가지로 이 약은 기립성 저혈압을 유발할 수 있고 그 증상으로 어지러움이나 실신이 나타날 수 있습니다. 이와 같은 증상은 첫 번째 투약이거나 용량을 높이는 경우, 한동안 중지했다가 다시 투약하는 경우 등에서 나타날 수 있습니다. 실신이나 저혈압을 방지하기 위해서 반드시 1mg 용량부터 투여하도록 합니다. 천천히 용량을 조절하면서 평가하고 추천된 용량을 매 2주마다 증가시킵니다. 2) 음경지속발기증 : 이 약과 같은 α -길항제는 지속발기증을 일으킬 수 있습니다. 만약 초기에 이를 치료하지 않으면 영구적으로 발기불능이 될 수 있기 때문에 환자들에게 이러한 상태의 심각성에 대하여 미리 충고하도록 합니다. 2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이 약 또는 퀴나졸린계 약물에 과민증 및 그 병력이 있는 환자 2) 백혈구·호중구감소증 환자 3) 저혈압 환자 또는 기립성 저혈압의 병력이 있는 환자 4) 12세 이하의 소아 3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오 : 간기능 장애 환자 4. 부작용 1) 혈액 : 무과립구증, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다. 2) 정신신경계 : 때때로 실신, 어지러움, 두통, 졸음, 불안, 불면, 구갈, 피로, 경련, 두중, 마비감, 권태감, 무력감 드물게 의식상실 등이 나타날 수 있습니다. 3) 감각기계 : 때때로 시각장애, 이명, 드물게 후각장애, 이통 등이 나타날 수 있습니다. 4) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 설사, 변비, 소화불량, 복부팽만감, 위부불쾌감, 복통, 위장염, 십이지장염, 구갈, 식욕부진, 구강건조 등이 나타날 수 있습니다. 5) 순환기계 : 때때로 기립성 저혈압, 저혈압, 심계항진, 부정맥, 빈맥, 말초혈관허혈, 부종, 흉부압박감, 협심증, 심근경색, 뇌혈관장애 등이 나타날 수 있습니다. 6) 호흡기계 : 때때로 호흡곤란, 비염, 코


파, 비충혈 등이 나타날 수 있습니다. 7) 비뇨기계 : 때때로 다뇨, 빈뇨, 요실금, 발기부전, 요통, 비뇨기계 감염, 드물게 음경지속발기 등이 나타날 수 있습니다. 8) 근골격계 : 때때로 흉통, 관절통, 근육통 등이 나타날 수 있습니다. 9) 간장 : 때때로 간기능이상, 황달, 간염, AST, ALT, ALP, LDH의 상승 등이 나타날 수 있습니다. 10) 피부 : 때때로 발한, 발진, 가려움, 자반 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다. 11) 기타 : 때때로 부종, 코막힘, 안면홍조 등이 나타날 수 있습니다. 5. 일반적 주의 1) 기립성 저혈압이 나타날 수 있으므로 이 약 투여전에 환자에게 기립시 천천히 일어서도록 충분히 주의시키며 저혈압이 나타나는 경우에는 환자의 머리를 낮게 하여 눕히고 인정을 시킵니다. 2) 전립선암의 경우에는 양성전립선비대증의 여러 증상과 유사하게 나타나므로 이 약 투여전에 전립선암의 진단 및 치료가 선행되어야 합니다. 3) 투여초기 또는 용량을 급격히 증가하는 경우에는 기립성 조절장애, 어지러움, 무력감, 발한, 심계항진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 환자를 바로 눕히고 대증요법을 취하는 등 적절한 처치를 합니다. 4) 투여초기 또는 용량을 급격히 증가하는 경우에는 혈압강화작용에 의해 어지러움이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다. 6. 상호작용 1) 이뇨제 또는 다른 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 상호작용이 증가될 수 있으므로 신중히 투여합니다. 2) 다음 약물과 뚜렷한 상호작용 없이 투여되고 있습니다. ① 협심증, 진통소염제(아세트아미노펜, 이부프로펜, 아스피린, 코데인, 인도메타신) ② 항생물질(에리스로마이신, 트리메토프림, 설파메톡사졸, 아목사실린) ③ 항히스타민제(클로르페니라민) ④ 심혈관약(아테놀올, 히드로클로로치아징, 프로프라놀롤) ⑤ 진정제(디아제팜) ⑥ 감기 인플루엔자 치료제 ⑦ 위장약(제산제) ⑧ 혈당강화제, 내분비약 7. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다. 2) 동물실험(랫트)에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단합니다. 8. 소아에 대한 투여 : 신생아, 미숙아, 유아, 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 없습니다.) 9. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강화는 바람직하지 않으므로 (뇌경색 등이 나타날 수 있습니다.) 저용량에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여합니다. 10. 과량투여시의 처치 : 과량투여하는 경우에는 기립성 저혈압이 나타날 수 있으므로 즉시 환자의 머리를 낮게 하여 눕히고 필요에 따라 체액증량제, 혈관수축제 등을 투여합니다. 이 약은 단백결합력이 커서 투석은 바람직하지 않습니다.

■ 저장방법 및 사용기한


기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위 : 300정

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.



제조의뢰자 · 판매원
한울제약주식회사
서울특별시 광진구 자양1동 779-5
공장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1
www.hanall.co.kr



제조사
경동제약주식회사
경기도 화성시 양감면 대양리 535-3