



중추성 근이완제

할올 메토카르바몰 정

(메토카르바몰)

메토카르바몰정은 U.S.P., K.P. 등에 수록된 제품으로서 광범위한 연구에 의해 중추신경계 특히 신경절 Neuron에 선택적이고도 직접적인 작용으로 골격근경련에 관여하여 Synapse반사를 억제하고 신경전도에 대한 지속적 차단을 통하여 근육의 이상긴장을 완화해 주는 작용이 인정되었으며, 근육경련에 대하여 강한 억제작용으로 근경련성 근육통을 신속히 회복하여주며 또한 조직혈류를 개선하여 염좌, 근육류마티즘에 대한 개선 효과가 탁월한 제제입니다.

■ 원료약품 및 그 분량

이 약 1 정 중

메토카르바몰(K.P.) 500mg

■ 성상

백색의 장방형 정제

■ 약리작용

1. 메토카르바몰정은 선택적인 신경절 차단작용을 나타내며, 신경절에 대한 직접작용으로 그 효과가 신속, 정확합니다.
2. 메토카르바몰정은 실험결과 Strychnine에 의한 경련에서 예방효과를 나타내며 전기자극에 의한 경련에는 Mephenesin carbamate보다 강한 억제작용을 나타냅니다.
3. 메토카르바몰정은 신경절 차단작용이 강력하여 파상풍에 의한 경련시에도 강력한 진경 효과를 나타내는 골격근 이완제입니다.
4. 메토카르바몰정은 근조직, 운동신경종판, 신경섬유에는 직접작용이 없으므로 다른 골격근 이완제에서 나타나는 부작용이 없습니다.

■ 효능·효과

근골격계질환에 수반하는 동통성 연속 : 요배통증, 경관원증후군, 견관절주위염, 변형성 척추증

■ 용법·용량

- 성인 : 메토카르바몰로서 1일 1.5~2.25g을 3회 분할 경구투여합니다.
- 소아 : 1일 체중 Kg당 60mg 을 초과하지 않습니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 또는 유사화합물(메프로바메이트)에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 신기능 장애가 있거나 우려되는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 간, 신장해 환자
 - 2) 전간환자(경련발작 유발가능성이 있습니다.)
3. 이상반응
 - 1) 과 민 증 : 때때로 발진, 소양감, 드물게 쇼크양 증상의 과민증이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.

- 2) 순 화 기 계 : 때때로 서맥, 혈압저하 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계 : 때때로 수기, 현기, 휘청거림, 운동실조, 두통, 두중감, 권태감, 무시, 저림감 등이 나타날 수 있으며 이때에는 투여량을 줄이거나 또는 투약을 일시 중지하든가 등의 적절한 조치를 하십시오.
- 4) 감 각 기 계 : 급속성의 미감을 느끼는 수가 있습니다.
- 5) 소 화 기 계 : 때때로 구역, 구토가 나타나는 수가 있습니다.
- 6) 기 타 : 발열, 비충혈이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 단독투여하는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의하십시오 : 페노치아진계 약물(클로로프로마진 등), 바르비탈계 약물등의 중추신경억제제, MAO저해제
- 2) 염산톨페리손과 병용투여시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

7. 소아에 대한 투여

영·유·소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

9. 임상검사치에 대한 영향

요중 5-히드록시인돌초산 및 요중 바닐만델산치를 상승시킵니다.

■ 저장방법·사용기한

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

외부 포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위

30, 50, 100, 500정

■ 제조·판매원 한울제약주식회사

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.

MCB-I-1
07-02-12

HANALL 
pharmaceutical

서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-SPACE B/D 6F
공 장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr