※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

신개념의 강력한 해열·진통제

KGMP 적격업체제품

푸리펜 정

Ibprofen + Arginine

일반의약품
분류번호114

푸리펜정은 해열·진통·소염 효과가 뛰어난 비스테로이드성 제제인 이부르포펜과 아미노산 제제인 아르기닌을 복합처방하여 용출율을 극대화시킨 신개념의 새로운 처방입니다.
푸리펜정은 소염·진통·해열작용이 매우 탁월하여 특히 류마티스성의 관절염을 비롯하여 각과 영역의 염증성·통증성 및 발열성 질환에 강력한 진통효과를 나타내주는우수한 제제입니다.

[성분·함량] 1정중
주성분: 이부프로펜(약전) ---------- 200mg
아르기닌(B.P) ---------- 185mg

[성　　상] 백색의 장방형 필름코팅 정제

[효능·효과]
1. 류마티양 관절염, 골관절염, 배통, 두통, 월경통, 외상 후 소염, 유행성 감기로 인한 발열 및 통증
※다른용도 사용시 심한 부작용이 나타날 우려가 있으니 주의하십시오.

[용법·용량]
성인 및 12세이상의 소아: 1회 1-2정을 4-6시간마다 물과 함께 복용한다. 1일 최대 6정(1200mg)까지 복용할 수 있다

[저장방법]
• 기밀용기, 실온(1~30℃)보관　　• 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
• 의약품을 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[사용기한]
• 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

[포　　장] 10, 100, 500, 1000정

[사용상의 주의사항]

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장 출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1)소화성궤양 환자
2)심한 혈액이상 환자
~~3)기관지 천식, 아스피린 천식 또는 그 병력이 있는 환자~~
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1)간장애 또는 그 병력이 있는 환자
2)신장애 또는 그 병력이 있는 환자
3)심기능부전 환자.
4)소화성궤양 또는 그 병력이 있는 환자
4. 부작용
1)소화기계: 구역, 복부팽만감, 위통, 가슴앓이, 식욕부진, 설사, 변비, 구토, 위염, 잠재성 출혈과다등의 증상이 나타날 수 있다. 또한 드물게 출혈을 동반한 소화기계의 궤양의 증상이 나타날 수 있다.
2)신경계: 때때로 반응성의 억제와 같은 중추신경 부작용, 두통, 현기증, 불안, 공포, 의식장애등의 증상이 나타날 수 있다. 또한 드물게 신경성 발작이 일어날 수 있다. 자가면역질환(전신성 홍반성 루푸스 증후군)환자에게 드물게 무균성 수막염이 유발 될 수 있으므로 신중히 투여한다.
3)감각기계: 때때로 이명, 난청, 약시 등의 증상이 나타날 수 있다.
4)과민증: 드물게 두드러기, 자반, 가려움증, 발진이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
5)피부: 드물게 스티븐슨-존슨증후군(피부점막안증후군)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
6)간장: 드물게 황달, GOT, GPT, AL-P의 상승 등이 나타날 수 있다.
7)혈액: 드물게 재생불량성빈혈, 용혈성 빈혈, 자가면역 출혈성 빈혈, 출혈, 과립구 감소, 혈소판 감소, 혈소판 기능저하(출혈시간 연장)등이 나타날 수 있으므로 혈액검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 있을 경우에는 즉시 투여를 중지한다.
8)신장: 드물게 급성신부전을 일으킬 수 있으므로 핍뇨, 혈뇨 등의 증상 및 요단백, BUN, 혈중 크레아티닌의 상승, 고칼륨혈증이 검사소견에서 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다. 전신부종 등이 나타날 수 있다.
5. 상호작용
1)경구용 항응혈제와 병용투여 시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
2)아스피린과 병용투여 시 이 약 및 다른 비스테로이드성 소염진통제의 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
3)프로베네시드, 설핀피라존과 병용투여시 이 약이 프로베네시드, 설핀피라존의 이뇨작용을 약하게 하여 이 약의 배설을 지연시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
4)이뇨제, 항고혈압제와 병용투여 시 그 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
5)디곡신과 병용투여 시 디곡신의 혈장 중 농도가 증가할 수 있으므로 신중히 투여한다.
6)페니토인과 병용투여 시 페니토인의 혈장중 농도가 증가할 수 있으므로 신중히 투여한다.
7)이 약은 혈장 리튬치를 증가시키고 청소율을 감소시키므로 리튬제제와 병용투여 시 리튬의 독성에 주의한다.
8)메토트랙세이트와 병용투여 시 그 혈액학적 독성을 증가시키므로 병용투여하지 않는다.
9)마크로엔과 병용투여 시 그 독성을 증감시키므로 병용투여하지 않는다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1)임부에 대한 안정성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
2)모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

※만약 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 또는 오손된 의약품은 약국, 병원 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

삼남제약주식회사
KGMP공장:충남 금산군 금산읍 상리 99-1
소비자 상담창구: 041-754-3771

작성일자: 20030701