

치질은 단일질환이라기 보다 항문주위에 생기는 모든 질환을 총칭한 것으로, 치핵(痔核), 치루(痔屢), 치열(痔烈), 항문주위농양 등을 포함합니다. 또 치질은 발생부위에 따라 내치질, 외치질로 구분하며 일반적으로 내외치질이 공존하기 쉽습니다. 치질은 일상생활과 밀접한 관계가 있는데, 어혈성체질(생리가 나쁘고 머리가 잘드는 체질), 냉성체질(특히, 하복부가 냉한 사람), 변비가 있는 사람, 장시간 앉아서 일하는 사람 등이 걸리기 쉽고 항문주위가 습할때(생리시), 임신이나 출산후, 과음이나 과로후에 치질이 생기거나 악화되는 수가 많습니다.

헤모케어정은 독일에서 각광받는 최신 치질치료제 처방에 따른 먹는 치질약으로, 염산헵타미놀과 트록세루틴을 고단위(300밀리그램씩)로 함유하고 말초혈관 장애를 개선하는 은행엽엑스를 보강하여 만든 아주 새로운 제제입니다. 본제는 내치질, 외치질, 치핵, 치루 등에 두루 잘들으며 3주 정도 복용하면 환자 스스로 증세의 호전을 확신하게 됩니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

은행엽엑스(식약청고시 제98-127호)〈총 키크플라본 배당체로서 2.1mg〉… 14.0mg
염산헵타미놀 (식약청고시 제98-127호) …………… 300.0mg
트록세루틴(식약청고시 제98-127호) …………… 300.0mg

【성상】

녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

- 정맥혈류 장애 (정맥류)로 인한 다음 증상의 치료 : 하지중압감, 정맥염, 야간 다리 경련
- 치질과 관련된 제증상

【용법·용량】

- 정맥질환 : 1회 1정, 1일 2회(아침, 저녁) 복용
- 치질증상 : 1회 1정, 1일 3~4회 식사중에 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 갑상선기능항진증 환자
 - 2) MAO저해제를 투여 받고 있는 환자
(이 약과 병용투여하는 경우에는 혈압상승이 나타날 수 있다.)
- 일반적 주의

염산헵타미놀이 함유되어 있으므로 중증의 동맥성 고혈압 환자에게 투여할 경우에는 동맥압을 신중히 관찰한다.
- 과량투여시의 처치

과량 또는 고의에 의하여 이 약을 과량투여하는 경우에는 동맥압 및 심장박동을 잘 관찰한다.
- 적용상의 주의

이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관, 사용기간: 2년

【포장단위】 자사포장단위

작성일: 2005. 6



한국웰즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4
소비자상담실: 031)494-5995

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.