항균성 정장 지사제

일반의약품
분류번호 : 239

엔터폴 캅셀

(니프록사짓)

KGMP
적격업체 제품

일상생활에서 부패 또는 오염된 음식물을 섭취하든가 냉음료, 스트레스등으로 인하여 장내세균총의 발란스가 깨어져서 유해세균총이 증가할때 세균에 대한 방어목적으로 설사를 하게 됩니다. 이때 우리는 신속히 대응하여 유해세균을 살균하여 장내세균총을 정상화 시켜 주어야 됩니다. 설사를 방치하면 장염, 장카타르, 장무력증, 장과민증 등 여러가지 나쁜 질환을 일으킬 수 있습니다.

엔터폴캅셀(Enterpol Caps.)은 Enteric(腸의)과 Police(경찰)의 합성어로 장내에서 본제가 유익한 균을 보호하고 유해한 균만 멸절하므로 마치 경찰과 같은 작용을 하는 정장지사제 입니다. 또한 본제는 인체내로 흡수되지않고 장내에서 정장작용만 담당하고 배설되는 약성분이므로 설사에는 매우 이상적인 제제입니다.

【원료약품의 분량】 1캅셀 중

니프록사짓(식약청고시 제98-127호) 200밀리그람

Nifuroxazide 또는 4-Hydroxybenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide

구조식 :



$C_{12}H_9N_3O_5$=275.22

【성 상】 황색의 분말성 과립으로 충전된 상·하 황색의 경질 캅셀제

【효능·효과】 1. 주 효능 효과 : 급성 세균성 설사

【용법·용량】

성인 : 니프록사짓으로서 1회 200밀리그람(1캅셀). 1일 4회 경구투여한다.
7일 이상 투여하지 않는다. 연령. 증상에 따라 적절히 증감한다.
투여기간 동안 수분을 공급하고 그 정도와 공급 방법은 설사의 심각도. 환자의 나이와 상태에 따라 조절한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 니트로푸란 유도체에 과민증의 병력이 있는 환자.
   2) 미숙아 및 1개월 미만의 신생아.
2. 부 작 용
   알레르기 반응이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
   침습의 임상증상을 수반하는 감염성 설사의 경우 일반적으로 항생물질 투여를 고려한다.

【약리작용 및 특장】

1. 강력하고 광범위한 항균력
   엔터폴캅셀은 이질균. 살모넬라균. 시겔라균. 그람양성구균등 광범위한 병원균에 대하여 강력한 살균작용을 나타냅니다.
2. 신속한 지사작용
   엔터폴캅셀은 소화관내에서 흡수되지 않고 장내에 도달하여 직접 항균작용을 하므로 항균 지사작용이 신속하게 나타납니다.
3. 정상세균총의 보호
   클로람페니콜등 항생제 투여시는 장내 정상세균총이 억제되거나 소실되어 약제 내성균이 많아져서 균교대 현상이 생길수 있으나 본제는 정상세균총을 보호하는 작용이 있습니다.
4. 내성균에 대한 효과
   엔터폴캅셀은 균에 대하여 내성을 유발하지 않을 뿐더러 항생제. 설파제등의 내성균에 대하여서도 강력한 항균력을 가지며 장내의 PH농도에 영향을 받지 않고 작용합니다.
5. 체내 비흡수에 의한 안전성
   본제는 니트로푸란계이므로 이 약제에 예민한 특수환자에게 알레르기 반응이 나타날수 있다는 보고 이외에는 거의 부작용이 없으며 특히 인체내에로 흡수되지 않기 때문에 안심하고 투여할 수 있습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

원진제약(주)
경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4
소비자상담실 : 031)494-3646

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.