

하이코민주사

분류번호 : 114

■ 원료약품의 분량 1mL 중

히드록소코발라민 (U.S.P.) 2.5mg
(Hydroxocobalamin)

■ 성 상

갈색 앰플내의 암적색액이 들어있는 주사제

■ 효능 · 효과

1. 다음 질환에 사용할 수 있다.

급성신경염, 다발성 신경염, 좌골신경통, 류마티양 신경통, 경견완증후군, 척수근통, 견갑관절주위염, 암 및 외상에 의한 신경통, 대상포진 및 편두통에 의한 신경통

■ 용법 · 용량

성인 : 히드록소코발라민으로서 1회 5000 μ g 1일 1회 근육주사 또는 정맥주사한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 비타민 B₁₂와 그 유사체에 과민증 환자

2) 악성종양 환자(조직발육에 대한 비타민 B₁₂의 작용으로 세포의 증식속도가 증가하지만 그 위험율에 대한 자료는 확실하지 않다.)

3) 임부

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

비타민 B₁₂와 그 유사체의 투여후에 나타나는 면역성 과민증은 매우 드물게 치명적일 수 있으므로 토양성 알레르기(천식, 습진)를 나타내는 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

4. 부작용

1) 과민증 : 드물게 가려움증, 두드러기, 홍반, 일과성의 발진, 속 등이 일어날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

2) 피부 : 여드름이 생길 수 있다.

3) 기타 : 요의 착색이 나타날 수 있다.

5. 적용상의 주의

근육주사시 동통을 일으킬 수 있다.

■ 저장방법

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

Huons Co., Ltd.

907-6 Sangshin-ri, Hyangnam-myun,
Hwaseong-city, Kyunggi-do, Korea