

휴온스 트라넥사민산 주사 250mg

분류번호 : 332

■ 원료약품의 분량 1밀리리터 중

트라넥사민산 (약전) 50 밀리그램

■ 성 상

무색투명한 액이 들어있는 무색투명한 앰플

■ 효능·효과

다음 질환에 사용할 수 있다.

전신성 섬유소성 용해 항진이 관여한다고 생각되는 출혈경향(백혈병, 재생 불량성 빈혈, 자반병, 암 등 및 수술중·수술후의 이상출혈)

국소 섬유소성 용해 항진이 관여한다고 생각되는 이상출혈(폐출혈, 성기출혈, 신출혈, 전립선 수술중·수술후의 이상출혈)

■ 용법·용량

트라넥사민산으로서 보통 성인 1일 250~500mg을 1~2회에 나누어 정맥 주사 또는 근육 주사한다.

수술중·수술후의 출혈 등에는 필요에 따라 1회 500~1000mg을 정맥주사 하거나 또는 500~2500mg을 점적 정주한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플 주사제는 용기 절단 시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단

사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용 시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 혈전이 있는 환자(뇌혈전, 심근경색, 혈전정맥염 등) 및 혈전증을 일으킬 우려가 있는 환자
- 2) 소모성 응고장애가 있는 환자(헤파린 등과 병용한다.)
- 3) 이 약에 대해 과민증인 환자

3. 부작용

- 1) 과민증 : 과민증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지할 것.
- 2) 피부 : 드물게 가려움, 발진 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 눈 : 정맥주사에 의하여 드물게 색각 이상 등이 나타날 수 있다.
- 4) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인지될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 할 것.
- 5) 기타 : 드물게 졸음, 두통이 나타날 수 있다.

4. 상호작용

지혈성 장기제제, 헤모코아굴라제와의 대량병용에 의해서 혈전형성 경향이 나타날 수 있으므로 병용하는 경우에는 신중히 투여할 것.

5. 적용상의 주의

서서히 정맥 주사할 것.(급속히 투여하면 드물게 구역, 흉내불쾌감, 심계항진, 혈압저하 등이 나타날 수 있다.)

6. 기타

- 1) 개에게 장기간 대량 투여하여 망막변화를 일으켰다는 보고가 있다.
- 2) 다음 주사제와 병용하는 경우 배합변화가 나타난다는 보고가 있다.(레세르핀, 탄닌산페네타딘, 메칠테스토스테론과 에칠에스트라디올의 혼합, 리피드트롬보프라스틴, 조직트롬보프라스틴, 설파디메톡신)

- 3) 이 약과 지혈성장기제제(리피드트롬보프라스틴)와의 정맥 내 대량병용에 의한 동물실험에서 혈전형성 경향이 나타난다는 보고가 있다.

■ 저장방법

밀봉용기, 실온(1~30℃)보관