

※ 2002년 7월 1일 이후부터 재조물 책임법이 시행되고 있습니다.

의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다용시형을 반드시 읽고 숙지하십시오.

※ 환자는 의사의 처방에 의해서만 약물을 복용합니다.

(환자임의로 용법·용량을 변경하여 복용해서는 안됩니다.)

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약지도 합니다.

2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.

3. 숨가와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

4. 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

5. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.

6. 사용 후 공기로 마개를 닫고 보관하며 개봉후에는 1개월 이상 사용하지 않습니다.

7. 사용하기 전에 잘 흔들어 섞습니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

[전문의약품]

항염점안제

후메토론 점안액

(플루오로메토론 0.1%)

후메토론점안액은 Prostaglandin의 합성을 광범위하게 차단시킴으로써 항염증 효과를 나타냅니다. 후메토론점안액은 전신작용이 약하고 국소적 소염효과가 좋은 스테로이드 제제로서, 안압상승작용은 betamethasone의 1/8~1/10을 나타내고, dexamethasone보다도 매우 낮은 발생률을 보이며 항염 효과는 hydrocortisone보다 40배정도 강력하여 다른 스테로이드 제제보다 우수한 효과를 나타냅니다.

[성분·함량] 이 약 1mL 중

플루오로메토론(유.에스.피)1mg

염화벤잘코늄액 10%(약전)0.5mg

[성상] 투명한 용기에 든 얇은 유백색의 수성 현탁액

[효능·효과]

외안부 및 전안부의 염증성 질환(안검염, 결막염, 각막염, 공막염, 상공막염, 홍채염, 홍채모양체염, 포도막염, 수술 후 염증 등)

[용법·용량]

1회 1~2방울 1일 2~4회 점안합니다.

증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게 투약하지 마십시오.

1) 표재성 단순포진 각막염(수차상 각막염), 우두, 수두를 포함한 바이러스성 각·결막 질환 환자

2) 진균성 안질환 환자

3) 눈의 미균박테리아 감염 환자

4) 만성 안검염 환자

5) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자

2. 다음의 환자에는 사용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 사용할 경우에는 신중히 투약하십시오.

1) 각막 상피 박리 또는 각막 궤양 환자(이러한 증상이 악화될 수 있고 또한 각막천공이 나타날 수 있습니다.)

2) 결핵성 안질환, 화농성 안질환 환자(이러한 증상이 악화될 수 있고 또한 각막천공이 나타날 수 있습니다.)

3) 녹내장 환자

4) 2세 미만의 영아

3. 부작용

1) 눈

① 코르티코스테로이드의 장기연용에 의해 시신경 손상, 시력저하 및 시야결손을 동반하는 녹내장과 안압상승이 나타날 수 있으므로 정기적으로 안압 검사를 합니다.

② 각막표진, 각막진균증, 녹농균감염증 등을 유발할 수 있으므로 이러한 경우에는 적절한 처치를 합니다.

③ 각막표진, 각막궤양 또는 외상 등에 사용한 경우에는 천공을 일으킬 수 있습니다.

④ 장기 사용에 의해 드물게 후방하 백내장이 나타나는 수가 있습니다.

⑤ 장기 사용에 의해 숙주면역반응의 억제로 이차 안감염의 위험이 증가할 수 있습니다.

⑥ 치료되지 않은 급성의 화농성 안감염이 코르티코스테로이드의 사용에 의해 오히려 악화되거나 악화될 수 있습니다.

⑦ 급성 포도막염, 각막염, 결막염, 각막궤양, 안동, 결막 충혈, 조절장애, 안검하수 등이 일어날 수 있습니다.

2) 청상 치유의 지연 : 백내장 수술 후 청상 치유의 지연을 일으키는 수가 있으며 수도 형성을 증가시킬 수 있습니다.

3) 허수체, 부신피질계 기능

장기 사용에 의해 허수체·부신피질계 기능의 억제를 일으킬 수 있습니다.

4) 과민증

과민증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다.

4. 일반적 주의

- 1) 의사의 진단없이 총혈된 눈에 국소 코르티코스테로이드 투여는 실명을 초래할 수 있습니다.
- 2) 단순 포진 병력이 있는 환자에게 코르티코스테로이드 투여 시 빈번한 세균 등 검사 실시 등 세심한 주의가 필요합니다.
- 3) 이 약의 10일 이상 장기투여 시 소아나 비협조적인 환자라 하더라도 정기적인 안압검사를 실시합니다.
- 4) 코르티코스테로이드는 머스타드 가스 각막염 및 쇼그렌 각결막염에는 효과가 없습니다.
- 5) 염증이나 통증이 48시간 이상 지속되거나 악화되면 투여를 중지하고 의사와 상의합니다.
- 6) 콘택트렌즈 착용자는 이 약 투여전 렌즈를 제거하고 적어도 투여 30분 이후에 재착용합니다.
- 7) 장안시 일시적인 시력불선명이 생길 수 있으므로 시야가 선명해질 때까지 운전이나 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.
- 8) 특히, 이 약 투여 중에 수두 또는 홍역에 감염되면, 치명적인 경과에 이를 수 있으므로, 다음 주의가 필요합니다.
 - ① 이 약 투여 전에 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종의 유무를 확인합니다.
 - ② 수두 또는 홍역의 병력이 없는 환자에 대해서는 수두 또는 홍역에의 감염을 최대한 방지하여 충분한 배려와 관찰을 합니다. 감염이 의심스러운 경우와 감염된 경우에는 즉시 진찰을 받아 지도하고, 적절한 처치를 합니다.
 - ③ 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종을 받은 적이 있는 환자에서도 이 약 투여 중에 수두 또는 홍역이 나타날 가능성이 있으므로 유의합니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 장기·빈번 사용을 피합니다.
- 2) 모유로의 이행여부는 알려지지 않았으나 수유부에 투여하는 경우 영아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 말고 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단합니다.

6. 소아에 대한 사용

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 특히 주의합니다.

8. 적응상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용합니다.
- 2) 점안 사용기의 일기가 직접 눈에 닿지 않도록 주의합니다.
- 3) 사용하기 전에 잘 흔들어 섞습니다.
- 4) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 36개월

【포장단위】 5mL

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 의약품등은 약국등의 개설자를 통하여 본사 영업부(TEL. 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부 (TEL. 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

※ <http://www.kukjepharm.co.kr>

가장 좋은 약은 사람입니다.



제조발매원

국제약품공업주식회사

경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

작성일 : 2003년 1월 27일

개정일 : 2003년 5월 21일

2006. 3. 24