※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

바 네 포® 연고

(바시트라신 · 네오마이신 · 폴리믹신비 제제)

20g

■ **원료약품의 분량** : 1g中

바시트라신(약전)	400단위
황산네오마이신(약전)	3.5mg(역가)
황산폴리믹신비(약전)	5000단위

■ **성 상**

백색-미황색의 연고제이다.

■ **약리작용 및 특장**

1. 강력한 복합 항생제 연고
   바네포(Banepo) 연고는 3가지의 항생제가 복합되어 있어 단일제제에 비해 그 살균작용이 훨씬 강하므로 혼합감염증에 특히 좋습니다.

2. 광범위한 항균작용
   Bacitracin, Neomycin sulfate, Polymyxin B sulfate가 복합되어 있으므로 penicillin이나 기타 스테로이드 제제보다 항균범위가 확대되어 포도상구균 (staphylococcus), 연쇄상구균(streptococcus), 화농성구균(pyogenic bacteria), 녹농균(pseudo-monas aeruginosa), 변형균속(proteus species)에 모두 강한 살균작용을 나타냅니다.

3. 자극성이 없습니다.
   환부에 도포시 penicillin과 같은 과민증을 유발하지 않으며 국소자극작용이 없으므로 도포시 쓰리거나 아프지 않습니다.

4. 뛰어난 피부 친화력
   주성분 외에 특수한 기제를 사용하여 피부에 대한 친화력을 증강시켰으므로 건성 · 습성 · 지루성 피부에 모두 사용할 수 있습니다.

■ **효능 · 효과**

경미한 베인상처, 긁힌상처, 화상의 감염방지.
※허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.

■ **용법 · 용량**

상처부위를 깨끗이 하고 1일 1~3회 적당량을 상처부위에 바른다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
2) 고막 천공이 있는 환자
3) 눈주위

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 상처가 심하거나 화상이 심한 환자
2) 찔린 상처, 동물에 물린 상처

3. 이상반응
1) 과민증 : 발진 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2) 장기연용 : 신장애, 난청이 나타날 수 있으므로 장기연용을 피한다.

4. 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.
3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4) 감작되어 있을 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 감작증상(가려움, 발적, 부종, 구진, 소수포 등)이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
5) 내성균 또는 비감수성균의 과잉증식을 초래할 수 있다. 이러한 현상이나 자극감, 과민증, 중복감염이 생길 경우에는 적절한 처치를 한다.
6) 광범위한 화상, 궤양이 있는 피부에는 장기간 사용하지 않는다.

5. **적용상의 주의**
이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.

6. **저장상의 주의사항**
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ **저장방법** : 기밀용기에 저장
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하를 방지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **포장단위** : 5, 10, 20, 450그람

---

* **소비자 상담창구**
본제품에 관하여 궁금한 점이 있으시면 아래의 연락처로 연락하여 주십시오.
주소 : 서울특별시 영등포구 양평동4가 8-3 대한약품공업주식회사 학술부
전화: (02) 2678-8445
e-mail: plan@daihan.com

* 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손 된 것일 때는 약국 · 도매상 · 병의원 등의 개설자에 한하여 구입처에서 신품으로 교환해 드립니다.

재작성년월일 2003. 5. 12

제조원
대한약품공업주식회사
공장 : 경기도 안산시 단원구 원시동 736-1