

레보트로시럽은 중추성 진해제와 동등 이상의 효과를 나타내는 말초 작용성 진해제로서 졸음, 진정 등의 중추 부작용이 없는 비마약성의 안전한 제제입니다.

■ 성분 · 함량 (100ml 중)

레보드로프로피진 (Levodropropizine)(별규)----- 600mg
파라옥시벤조산메틸(케이.피.)----- 80mg
파라옥시벤조산프로필(케이.피.)----- 20mg

■ 성 상

불투명 흰색병에 든 딸기향이 첨가된 투명한 시럽제

■ 특 장 점

1. 말초에 작용하여 CNS 억제 효과가 낮아 진정, 졸음 등의 부작용이 없습니다.
2. 비마약성 진해제로서 부작용이 거의 없는 안전한 제제입니다.
3. 다양한 질환에 의한 모든 종류의 기침을 효과적으로 억제합니다.

■ 효능 · 효과

기침 : 급 · 만성 기관지염

■ 용법 · 용량

성인 : 1회 약 10ml, 1일 3회
소아 : 10 ~ 20kg : 1회 약 3ml, 1일 3회
20 ~ 30kg : 1회 약 5ml, 1일 3회

전문의약품



500ml

분류번호:222

5. 임부 및 수유부에의 사용

임부 및 임신가능자, 수유부에는 투여하지 마십시오.

■ 저장방법 및 사용기한

기밀용기, 실온보관(1~30℃), 3년

■ 포장단위 500ml

설명서 개정년월일 : 2008. 7. 17

재 질 : 용기-HDPE, 마개-PP

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

본사 : 서울특별시 동대문구 장안 2동 315-18
공장 : 충청북도 충주시 양성면 본평리 산 5-1

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.
이 약에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 24개월 미만의 유아
2) 심각한 신부전 환자
3. 부작용
1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
3) 순환기계 : 두근거림
4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의하십시오.