



【성분·함량】

케어스킨로션 1%(1g 중)

히드로코르티손(유.에스.피.)	10mg
파라옥시벤조산에틸(케이.피.)	1.5mg
파라옥시벤조산프로필(케이.피.)	0.1mg
케어스킨 로션 2.5% (1g 중)	
히드로코르티손(유.에스.피.)	25mg
파라옥시벤조산에틸(케이.피.)	1.5mg
파라옥시벤조산프로필(케이.피.)	0.1mg

【성 상】 백색의 로오손제

【효능·효과】 습진·피부염군, 피부가려움, 벌레물린 데

【조금 · 조금】

사용전 잘 흔들어 섞은 후 1일 1-3회 적당량을 환부에 바르고 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 세균(결핵, 매독 등) · 진균(칸디다증, 백선 등) · 바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍진 등) · 동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
 - 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 3) 고막 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유지연이 나타날 수 있습니다.)
 - 4) 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재생 이상의 화상 · 동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있습니다.)
 - 5) 임주위피부염, 보통여드름, 주사 환자
 - 6) 2세 미만 유아
2. 다음 환자에는 신중히 사용하십시오.
- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
 - 2) 유 · 소아
 - 3) 고령자
 - 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 부작용

- (1) 피부
 - ① 감염증: 피부의 세균성(전염성) 농가진, 모낭염 등) 및 진균성(칸디다증, 백선 등) 감염증이 나타날 수 있습니다. [밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽습니다.] 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제 등을 병용하고 증상이 신속하게 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지하십시오.
 - ② 일반적 피부증상: 모낭염, 부스럼, 피부자국, 자통, 발열, 작열감, 발진, 발적, 홍조, 가려움, 피부건조, 농포성 피부염, 알레르기성 접촉 피부염, 따개비, 한진, 상처악화, 욕창, 농포증 등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.
 - ③ 전지 연유: 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관확장, 자반), 스테로이드성 주사, 입주사(피부염)(입주사·안면 전체에 흉반, 구진, 모세혈관확장, 딱지, 인설), 어린선(魚鱗瘡)양 피부변화, 다모, 색소탈실, 선조, 수포성 피부염, 이토피피부염, 피부 출혈 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용하십시오.
- (2) 내분비계: 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신 투여와 같은 뇌하수체·부신피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의하십시오.
- (3) 눈: 안검피부에 사용시 안압 상승, 녹내장 증상을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (4) 난 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후당하행배내장, 녹내장 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

- 1) 피부 감염을 수반하는 습진·피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한

항균제(전신적용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려하십시오.

- 2) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 억제, 쿠싱증후군, 과월경증, 당뇨병을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 일붕붕대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사하십시오.
 - 3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 황실이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복됩니다.
 - 4) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지하십시오.
 - 5) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지하십시오.
 - 6) 이 약의 치료기간은 7일 이내로 제한하십시오.
- 5. 임부 및 수유부에 대한 투여**
- 1) 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피부도포로 인해 기형발생이 나타났습니다.
 - 2) 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
 - 3) 이 약이 모유로 이행한다는 보고는 없으나 전신적으로 흡수된 코르티코이드가 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여시 주의하십시오.

6. 소아에 대한 투여

- 1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의하십시오.
- 2) 기저귀 등은 밀봉봉쇄법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의하십시오.

7. 고려자에 대한 투여

일반적으로 교량에서는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게(특히 밀봉붕대법)사용할 경우 충분히 관찰하는 등 주의하십시오.

8. 적용상의 주의

- 1) 안과용으로 사용하지 마십시오.
- 2) 화장이나 면도 후 등 치료이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 3) 의사의 감독 없이 밀봉봉대법을 사용하지 마십시오.(특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용전에 환부를 철저히 하십시오.)

9. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

10. 기타

건설회사에 장기간, 대량 사용한 경우 치료 중 또는 치료중지 후 건설행혈피증, 농포성건선 등이 나타났다는 보고가 있습니다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 2년

【포장단위】

케어스킨로션 1% : 60a

케어스킨로션 2.5% : 30a, 60a

- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 “소비자 분쟁 해결 기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

코스닥상장
제조의뢰자:  **신일제약(주)**
충청북도 충주시 암성면 본령리 산 5-1

제 조 자:  **한 국 콜 마**
충남 연기군 전의면 신정리 618-3

판매자:  **제이에스 팜(주)**
For Dermal Medication
서울 은평구 신사2동 185-4 ☎02)372-6425



설명서 개정년월일 : 2008. 12. 8