

28213M20807


어린이 코감기 전문치료제
코린시럽 시럽
Korin Syrup

일반의약품
분류번호 : 141

코린시럽은 어린이가 먹기 쉽게 만든 딸기맛 시럽제로서 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민과 비충혈 제거제인 염산페닐레프린을 합리적으로 처방된 어린이 코감기 전문치료제로서 재채기, 콧물, 코막힘 등의 비염, 코감기 증상을 신속히 치료하여 줍니다.

[성분·함량] (100ml 중)

페닐레프린염산염 (케이.피.)	400 mg
클로르페니라민말레산염 (케이.피.)	40 mg
파라옥시벤조산메틸 (케이.피.)	90 mg
파라옥시벤조산프로필 (케이.피.)	10 mg
적색 40호 (타르색소G시)	

[효능·효과]

감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
부비동염에 의한 비충혈의 일시적 완화

[성상]

딸기향이 있는 담적색의 단맛이 있는 시럽제

[용법·용량]

성인(만12세 이상) : 4시간마다 10㎖씩 복용하되, 24시간동안 60㎖를 초과하지 않도록 하거나 의사의 지시에 따르십시오.
만 6 ~ 12세 소아 : 4시간마다 5㎖씩 복용하되, 24시간동안 30㎖를 초과하지 않도록 하거나 의사의 지시에 따르십시오.
만 2~6세 이하 소아 : 의사의 지시에 따르십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 복용하지 마십시오.

- 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자
- 특이체질 환자
- 수유부
- 중증의 고혈압 환자, 중증의 관상동맥질환 환자, MAO 저해제 치료를 받고 있는 환자
- 협우각성 녹내장, 뇨저류, 소화성 궤양, 천식, 폐기종, 만성폐질환, 숨이 차거나, 호흡곤란이 있는 환자
- 진정제, 신경안정제를 투여 받고 있는 환자

2. 다음 경우에는 신중히 복용하십시오.

만성 기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 감상선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선 비대증으로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 마십시오.

3. 이상반응

- 교감신경아민을 포함한 약제는 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있습니다. : 공포, 불안, 긴장, 진전, 쇠약, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관 허탈
- 페닐레프린에 과민인 사람은 빈맥, 동계, 두통, 어지러움, 오심 등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있습니다. 그러나 페닐레프린을 적량 투여 시는 이런 이상반응이 나타나지 않는 안전한 약물입니다.
- 항히스타민제에 과민인 사람은 중증도의 진정작용을 나타낼 수 있습니다.
- 항히스타민제로 인한 다른 부작용은 구갈, 어지러움, 쇠약, 식욕부진, 오심, 구토, 두통, 신경과민, 다뇨증, 가슴앓이, 복시, 배뇨곤란 등이 있고 드물게 피부염이 나타날 수도 있습니다.
- 졸음을 일으킬 수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등이 졸음을 증가시킬 수 있습니다.
- 어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 의사와 상의하십시오.
- 이 약의 복용 중에는 알코올성 음료를 피하십시오.
- 이 약의 복용 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 하십시오.
- 용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량 복용 시에는 의사와 상의하십시오.
- 이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의하십시오.

5. 소아에 대한 투여

2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 하십시오. 2세 미만의 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관하십시오.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 3년

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재경정제부고시 “소비자 피해보상 규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**

