

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
염산세티리진(BP) - - - - - 10mg

【성 상】
백색의 타원형 필름코팅정제

【용법 · 용량】

6세 이상 소아 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정(염산세티리진
으로서 10mg)부작용에 민감한 환자의 경우는 5mg씩 아
침, 저녁에 나누어 복용한다.

일반의약품

알레르기 전문치료제

타미진 정

알레르기성 비염, 결막염

두드러기, 가려움증

10정

【효능·효과】

계절성 알레르기로 인한 비염, 결막염,
다년성 비염, 가려움, 만성 특발성 두드러기

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사 포장 단위

■ 약리작용

1. 타미진은 항히스타민작용이 강력합니다.
2. 타미진정은 선택성이 뛰어나 중추작용, 진정작용 등의 부작용이 없습니다.
3. 타미진정은 1일 1회 투여로 약효가 지속됩니다.
4. 타미진정은 약효작용 발현시간이 신속한 속효성 알레르기 치료제입니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 신부전 환자
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 4) 6세 미만의 유아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 신장에 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
 - 2) 간장에 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
 - 3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
3. 부작용
 - 1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중, 흥분이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구순 건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상 나타날 수 있다.
 - 3) 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 4) 혈액 : 맥관염, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구증가, 드물게 단구 증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시 쇼크, 때때로 부종, 드물게 발진, 가려움, 맥관부종이 나타날 수 있다.
 - 6) 눈 : 드물게 호린시력, 결막충혈이 나타날 수 있다.
 - 7) 간 : 때때로 AST, ALT, ALP 총빌리루빈, γ -GTP, LDH의 상승 등 간기능장애(초기증상 : 전신 권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있다.
 - 9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있다.

분류번호:141

4. 일반적 주의 : 건강한 지원자에게 1일 20~25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응 시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작시에는 용량을 초과하지 않는다.
5. 상호작용 : 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여하지 않는다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여 : 1) 동물 실험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않는다. 2) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여중에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여 : 6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않는다.
8. 고령자에 대한 투여 : 이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 한다.
9. 과량투여시의 처치 : 과량 투여시의 증상은 진정이다. 이 경우 위세척을 실시한다.
10. 임상검사치에의 영향 : 이 약은 알레르기항원피내반응을 억제하므로 알레르기항원 피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직하다.
11. 기타 : 증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있다.

■ 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한제품입니다. 만약구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제조·판매원 : 경상북도 문경시 산양면 진정리 622

■ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054-552-5381)로 문의하시기 바랍니다.

개정일자 : 2004. 4. 30

