위장관 운동 개선제

썰피란정

레보설피리드

전문의약품
분류번호 : 239

썰피란 정은 연수의 chemoreceptor trigger zone 및 위장관의 dopamine (DA_2) receptor에 동시에 작용하는 길항제로서 위장관계의 물리적 원인 및 심리적 원인과 관련된 소화불량에 대해서 우수한 치료효과를 나타내는 위장관 운동 개선제입니다.
썰피란 정은 sulpiride의 *l*-isomer로서 이는 d-isomer보다 3~8배 작용이 강하며 DA_2 receptor에 대한 선택성이 보다 높아 효과는 높으며 부작용이 거의 없는 안전한 위장관 운동 개선제 입니다.

《원료약품의 분량》 이 약 1정 중
레보설피리드(식약청고시 제2001-11호) ····· 25mg

《성　　상》
백색의 원형 정제

《특 장 점》
1. 강력한 도파민 수용체 차단작용으로 위장기능을 정상화하며 중추와 말초에 동시에 작용하여 효과가 더욱 뛰어납니다.
2. 중추에 작용하여 우수한 진토작용(metoclopramide제제의 4배)을 나타내어 오심과 구토를 억제합니다.
3. 당뇨병성 위무력증 환자의 위내용 배출을 촉진시켜 위장관계 증후군을 경감시킵니다.
4. cisapride제제와 달리 심혈관계 및 기타 심각한 부작용을 일으키지 않는 안전한 제제입니다.

《효 능 · 효 과》
기능성 소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 :
복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

《용 법 · 용 량》
통상 성인 1회 1정, 1일 3회 식전 복용

《사용상의 주의사항》

1.다음환자에는 투여하지 마십시오.
① 임신중이거나 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
② 위장관 운동자극이 유해한 환자. 즉 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자
③ 갈색세포종 환자에게는 이 종양으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발할 수 있으므로 투여하지 마십시오.
④ 이 약에 과민성이 있거나 불내성인 환자
⑤ 간질환자, 조병 상태 및 조울병의 조병단계의 환자
⑥ 대부분의 향정신성 의약품이 가지고 있는 프로락틴 과분비 효과와 유방형성 장해간에 상호관련성이 있다고 여겨지므로 악성유선증 환자에게는 투여하지 마십시오.

2.다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
① 고혈압 환자
② 소아(추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 과량 투여하지 않도록 주의하십시오.)
③ 고령자

3.부작용
① 내분비계 : 때때로 간뇌의 내분비 기능 조절이상(고나도트로핀 분비 및 프로락틴분비 이상)에 기인한다고 추정되는 무월경, 지속성유즙누출, 여성형 유방이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나면 즉시 투약을 중지하십시오.
② 추체외로계 : 드물게 진전, 혀의 굳어짐, 초조감 등이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투약을 중지하십시오. 또 장기투여에 의해서 드물게 입주위 등에 불수의 운동이 나타나서 약물투여를 중지한 후에도 지속되는 수가 있습니다.
③ 소화기계 : 때때로 구갈, 속쓰림, 구역, 구토, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
④ 순환계 : 고혈압이 나타날 수 있습니다.
⑤ 기타 : 드물게 발진, 부종이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 약물투여를 중지하십시오. 또한 때때로 열감, 권태감, 불면, 졸음, 현기, 비틀거림이 나타날 수 있고 드물게 음위가 나타날 수 있습니다.
⑥ 장기투여의 경우 무월경, 여성형 유방, 유즙분비 과다 및 성욕의 증감과 같은 부작용이 나타날 수 있는데 이는 다른 신경이완제들과 유사하게 시상하부 뇌하수체 생식선 제2경추의 기능에 대한 효과로서 가역적입니다.

4.일반적 주의

① 간뇌의 내분비기능 조절이상으로 인해 프로락틴의 분비가 증가하고 유즙누출의 부작용이 있으므로 처방 전 반드시 이러한 부작용이 있음을 환자에게 주지시켜 주십시오.
② 간뇌의 내분비기능조절이상, 추체외로 증상 등의 부작용을 일으킬 수 있으므로 유효성과 안전성을 충분히 고려하여 투여하십시오.
③ 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 및 주의를 집중해야하는 기계조작을 피하는 것이 좋습니다.

5.상호작용

① 위장관운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린효능약(아트로핀, 메칠스코폴라민 등), 마약 및 진통제에 의해 길항적으로 나타날 수 있으므로 병용하지 마십시오.
② 디기탈리스제제 포화시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상을 불현성화할 수 있으므로 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자에서는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여하십시오.
③ 다른 벤즈아미드계 약제(메토클로프라미드, 티아프라이드 등)와의 병용에 의한 내분비기능 이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 이것들을 병용하는 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여하십시오.
④ 정신약리학적 약물과의 병용투여는 상호작용에 기인한 예기치 않은 부작용을 피하기 위해 특별한 주의가 요구되며 알코올과의 동시투여는 피해야 합니다.

6.임부에 대한 투여

동물실험에서 태아에 대한 기형 발생의 위험이 있는 것으로 보고되어 있으며, 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

7.수유부에 대한 투여

신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

8.고령자에 대한 투여

주로 신장으로 배설되나 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 높은 혈장농도가 지속될 우려가 있으므로 부작용(추체외로 증상 등)의 발현에 주의하고 용량 및 투여 간격에 유의하는 등 신중히 투여하십시오.

9.기타

① 진토작용이 있기 때문에 다른 약에 기인하는 중독, 장폐색, 뇌종양에 의한 구토증상이 나타나지 않게 할 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여하십시오.
② 동물 만성독성 실험에서 정소위축과 번식실험에서 임신율의 저하를 일으킨다는 보고가 있습니다.
③ 랫트 및 마우스에 고용량을 장기간 투여한 결과 하수체, 유선 등의 종양발생빈도가 대조군에 비해 높다는 보고가 있습니다.

《저장방법》 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
《사용기간》 제조일로부터 36개월
《포장단위》 100, 500정

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

소비자 상담실 : (02) 3408-8349

홈페이지「www.yungjin.co.kr」

문서작성일 : 2002년 10월 7일

제조발매원
영진약품공업주식회사
본사 : 서울 · 성동구 성수2가 3동 277-58
공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5