전문의약품

KGMP 적격업체제품

이담소화제

아벨라정

Alibendol

ABELRA Tablet

문명의 발달에 따라 질병의 발생도 다양화되고 만성화되는 경향이 두드러지고 있습니다. 특히 현대는 물질문명의 발달과 복잡한 사회생활로 인하여 정신적 스트레스, 육체적 피로, 음주, 간염 및 각종 중금속물질 등으로 위장의 부담을 가중시켜 소화불량, 속쓰림, 위통, 구역 등 여러 가지 불쾌한 증상을 일으킵니다.

아벨라정은 Alibendol 제제로서 간·담도에 특이적으로 작용하여 담즙의 생성 및 분비를 촉진시켜 주며, 또한 오디괄약근(Oddi's sphincter)의 경련을 억제하여 소화불량, 변비, 설사, 구역, 구토 등의 증상을 신속히 치료해 주는 새로운 이담소화제입니다.

원료약품의 분량 1정 중

알리벤돌 (Alibendol) …… (식약청고시 98-127호) …… 100mg

성 상 분홍색 원형의 당의정

약리작용

1. 담즙분비 조절작용

담즙분비를 증가시켜 지방질의 소화흡수를 촉진하며 다른 영양소의 소화흡수도 촉진합니다.

2. 광범위한 효과

단순소화불량 뿐 아니라 간경변, 담석증, 담낭절제 증후군, 담낭운동장애, 바이러스성 간염 등에 의해 유발된 소화불량에도 효과가 뛰어납니다.

3. 진경작용

강력한 진경작용을 지녀 장관의 긴장으로 유발되는 과민성대장 증후군(변비, 설사, 변비 및 설사의 교대증상 등)을 치료해 줍니다.

4. 안전성

탁월한 내약성과 부작용 및 금기사항, 타 약물과의 상호작용 등이 없으므로 보다 안전하게 처방할 수 있습니다.

효능·효과

주효능효과 : 소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상 치료

용법·용량

성인 : 알리벤돌로서 1일 300~400mg을 3~4회 분할하여 식전 및 취침시 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 일반적 주의
   1) 다른 약물을 투여하고 있는 경우에는 투여하기 전에 약사 또는 의사와 상의한다.
   2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세 미만의 영·유아에게 경구 투여하지 않는다
3. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여드립니다.

제품문의 TEL. (032) 812-8356

제조발매원
영풍제약주식회사
인천광역시 남동구 남촌동 621-9